



**Министерство здравоохранения и социального развития РФ
ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого**

Неотложная антимикробная терапия инфекций челюстно- лицевой области (собственные данные)

Выполнили: Федотов В.В, Афанасьева А.В.,
студенты 306 группы ФФМО


Куратор: Куркучекова Т.А.




Цель:

Провести фармакоэпидемиологический анализ используемых антибактериальных средств при лечении инфекций челюстно-лицевой области на примере отделения челюстно-лицевой хирургии многопрофильного стационара, на основании данных микробиологического исследования


Этиология инфекций ЧЛО (по данным материалов ЧЛХ ККБ №1)




Основные диагнозы отделения ЧЛХ ККБ №1




Этиология инфекций




Грам «+»



Грам «-»



Микробные ассоциации



Pseud aeruginosa+Ent faecium

(от больного с флегмоной)

Strept pyogenes+Strept haemolyticus

(от больного с кистой)

Strept haemolyticus+Staph aureus

(от больного с остеомиелитом)

Staph aureus + Acinetobacter baumannii

(от больного с флегмоной)


Staph aureus + Cand glabrata

(от больного с фурункулом)


Pseud aeruginosa+Staph epidermidis

(от больного с остеомиелитом)


Частота встречаемости представителей микрофлоры при абсцессе ЧЛЮ




Частота встречаемости представителей микрофлоры при карбункуле, фурункуле ЧЛО



Частота встречаемости представителей микрофлоры при флегмоне ЧЛО





Частота встречаемости представителей микрофлоры при остеомиелите ЧЛЮ



Антибиограма Streptococcus haemolyticus

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ


РЕЗИСТЕНТНОСТЬ



Антибиотикограмма Strept pyogenes


чувствительность

резистентность



Антибиограмы стафилококков

чувствительность





резистентность

оксациллин


прир. и
полус. пен.

ко всем б-
лактамым


Антибиотикограмма Ent faecium




Антибиотикограмма Pseud aeruginosa




Антибиотикограмма Pseud aeruginosa






Антибактериальные средства использованные при лечении абсцессов ЧЛЮ

- Линкомицин – 83%(5); 6 дней
- Амоксиклав – 17%(1); 6 дней




Антибактериальные средства использованные при лечении остеомиелитов ЧЛО

- Линкомицин – 83%(5); 8 дней
- Цефтриаксон – 17%(1); 9 дней



Антибактериальные средства использованные при лечении фурункулов ЧЛО

- Линкомицин – 50%(12); 6 дней
- Цефазолин – 50%(12); 8 дней




Антибактериальные средства использованные при лечении флегмон ЧЛО

- Линкомицин – 37%(11); 6 дней
- Цефтриаксон – 27%(8); 6 дней
- Цефазолин – 16%(5); 10 дней
- Амоксиклав – 10%(3); 7 дней
- Амоксициллин – 10%(3); 7 дней



Выводы

- *Антибактериальные средства (АБС) наряду с другими группами препаратов относятся к категории жизненноважных средств. Своевременное назначение способствует спасению жизни человека.*
- *Отделение челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) в составе крупного многопрофильного стационара использует в лечении бактериальных инфекций челюстно-лицевой области АБС всего 2 групп: линкозамиды и цефалоспорины.*
- *Не используются или недостаточно используются препараты «респираторных» фторхинолонов, ингибиторозащищенные пенициллины, новые макролиды, гликопептиды.*



Данные нашего «пилотного» фармакоэпидемиологического исследования могут быть использованы для дальнейшего анализа эффективности антибиотикотерапии инфекций челюстно-лицевой области, выработки рекомендаций по адекватной смене антибиотикотерапии.

A vertical decorative bar on the left side of the slide, composed of various colored segments including shades of blue, black, yellow, and grey, arranged in a pattern that tapers slightly towards the top and bottom.

Благодарим за внимание