



ПОПУЛЯЦИИ

Плодовитость, R_0 и r
Кому давать орден
«Мать-героиня»

Два типа l_x кривых:

1) **Когортные** (*age-specific*,
динамические)

2) **Статические** (*time-specific*,
характерные для небольшого
отрезка времени)



http://www.alaskanalpinetreks.com/ImageGallery/Wildlife_3/DallSheepRamStandingOnRock.html

Когортная таблица выживания для барана Далла (*Ovis dalli*)

(Построено по материалам анализа 608 черепов)

x	n_x	d_x	l_x	q_x	L_x	T_x	e_x
0-1	1000	199	1,000	0,199	900,5	7053	7,0
1-2	801	12	0,801	0,015	795	6152,5	7,7
2-3	789	13	0,789	0,016	776,5	5357,5	6,8
3-4	776	12	0,776	0,015	770	4581	5,9
4-5	764	30	0,764	0,039	749	3811	5,0
5-6	734	46	0,734	0,063	711	3062	4,2
....
9-10	439	187	0,439	0,426	345,5	576,5	1,3
10-11	252	136	0,252	0,619	174	231	0,9
11-12	96	90	0,096	0,937	51	57	0,6
12-13	6	3	0,006	0,500	4,5	6	1,0
13-14	3	3	0,003	1,00	1,5	1,5	0,5

Удельная смертность в разных возрастных группах для барана Далла отдельно ♂ и ♀ (Аляска) и домашней овцы (Новая Зеландия)




FIGURE 42. Specific mortality of Dall sheep (♂ and ♀, solid lines) compared with that of the domestic sheep (*Ovis aries*) (dotted line) in New Zealand (data from Murie and from Hickey, as analyzed by Caughley).

x – возрастной интервал (класс)

n_x – число ВЫЖИВШИХ на начало возрастного интервала **x**

d_x – число умерших между началом возрастного интервала **x** и началом возрастного интервала **$x + 1$**

l_x – доля ДОЖИВШИХ до начала возрастного интервала **x**

q_x – смертность между
началом возрастного
интервала x и началом
возрастного интервала $x + 1$

e_x - ожидаемая
продолжительность жизни для
организмов, живых в начале
возрастного интервала x

$$q_x = \frac{d_x}{n_0}$$

$$e_x = \frac{T_x}{n_x}$$

$$l_x = \frac{n_x}{n_0}$$

$$q_x = \frac{d_x}{n_0}$$


$$L_x = \frac{n_x + n_{x+1}}{2}$$

$$T_x = \sum_{i=x}^S L_i$$

Где S – суммарное число возрастных классов, в данном случае $S=13$

**Средняя ожидаемая
продолжительность дальнейшей
жизни**

$$e_x = \frac{T_x}{n_x}$$




**Когортная таблица выживания для барана Далла
(*Ovis dalli*)**

(Построено по материалам анализа 608 черепов)

x	n_x	d_x	l_x	q_x	L_x	T_x	e_x
0-1	1000	199	1,000	0,199	900,5	7053	7,0
1-2	801	12	0,801	0,015	795	6152,5	7,7
2-3	789	13	0,789	0,016	776,5	5357,5	6,8
3-4	776	12	0,776	0,015	770	4581	5,9
4-5	764	30	0,764	0,039	749	3811	5,0
5-6	734	46	0,734	0,063	711	3062	4,2

**Когортная таблица выживания для барана Далла (*Ovis dalli*)
(Построено по материалам анализа 608 черепов)**

x	n_x	d_x	l_x	q_x	L_x	T_x	e_x
6-7	688	48	0,688	0,070	664	2351	3,4
7-8	640	69	0,640	0,108	605,5	1687	2,6
8-9	571	132	0,571	0,231	505	1081,5	1,9
9-10	439	187	0,439	0,426	345,5	576,5	1,3
10-11	252	136	0,252	0,619	174	231	0,9
11-12	96	90	0,096	0,937	51	57	0,6
12-13	6	3	0,006	0,500	4,5	6	1,0
13-14	3	3	0,003	1,00	1,5	1,5	0,5



Kenya 2006



Dxx

Kenya 2006



Dxx

Fecundity schedule for female lions.

x (YEARS)	l_x	m_x	$l_x m_x$
0-1	1.00	0.00	0.00
1-2	0.75	0.00	0.00
2-3	0.58	0.14	0.08
3-4	0.58	0.57	0.33
4-5	0.50	0.50	0.25
5-6	0.42	0.00	0.00
6-7	0.33	1.25	0.42
7-8	0.25	0.67	0.17
8-9	0.25	0.33	0.08
9-10	0.17	0.00	0.00
10-11	0.08	0.00	0.00
			<hr/> $R_0 = 1.33$

Возрастные интервалы годы x	Доля доживших l_x	Число потомков, произведенных в среднем одной самкой данного возраста m_x	$l_x m_x$
0-1	1.00	0.00	0.00
1-2	0.75	0.00	0.00
2-3	0.58	0.14	0.08
3-4	0.58	0.57	0.33
4-5	0.50	0.50	0.25
5-6	0.42	0.00	0.00
6-7	0.33	1.25	0.42
7-8	0.25	0.67	0.17
8-9	0.25	0.33	0.08
9-10	0.17	0.00	0.00
10-11	0.08	0.00	0.00
			$R_0=1.33$

R_0 - Net reproductive rate

чистая скорость воспроизводства

$$R_0 = \sum_{x=0}^{\infty} l_x m_x$$


R_0 - безразмерная величина

Показывает во сколько раз возросла
численность популяции за одно
поколение

Если

$$R_0 = 1$$

популяция сохраняет
неизменную численность



■ **FIGURE 6.5** Four examples of geometric population growth, discrete generation, constant reproductive rate. $N_0 = 10$.

$$R_0 = \frac{N_t}{N_0}$$

$$N_t = N_0 e^{rt}$$

$$N_T = N_0 e^{rT}$$

$$R_0 = e^{rT}$$

$$r \approx \frac{\ln R_0}{T}$$

Кому давать орден «Мать-героиня»?



Кому давать орден «Мать-героиня»?

Популяция, где по пять детей у молодых матерей (в год по ребенку с 18 до 22 лет):

$$R_0 = 2.5 \quad T = 20 \text{ лет}$$

Популяция, где по десять детей у более взрослых матерей (в год по ребенку с 31 до 40 лет):

$$R_0 = 5 \quad T = 35.5 \text{ лет}$$


Кому давать орден «Мать-героиня»?

$$r \approx \frac{\ln R_0}{T}$$

Кому давать орден «Мать-героиня»?

$$r_1 = \text{Ln } 2.5 / 20 = \\ 0.916 / 20 = 0.0458$$

$$r_2 = \text{Ln } 5 / 35.5 = \\ 1.609 / 35 = 0.0453$$




Alfred James Lotka (1880-1949)


Механическая модель, предложенная А.Лоткой для определения длительности поколения.

В 1920 г. в США на 100 000 матерей приходилось 116760 дочерей. Каков был возраст матери?

28.5 лет



Зависимость удельной скорости популяционного роста (на одну самку за неделю) жуков *Calandra oryzae* и *Rhizopertha dominica* от температуры и влажности



Зависимость удельной рождаемости и смертности от концентрации лимитирующего ресурса



**Зависимость
удельной скорости
популяционного
роста от
концентрации
лимитирующего
ресурса**




FIGURE 29. A and B. The experimentally determined requirements of two species of freshwater algae (*Asterionella formosa* and *Cyclotella meneghiniana*) for limiting phosphate (from Tilman and Kilham, 1976).

C and D. The requirements of these same species for limiting silicate. The predicted requirements of these species for these two resources at a mortality rate of 0.25 day^{-1} are labeled R^* .




FIGURE 30. A and B. The data of Figure 29 were used to predict the position of the ZNGI of each of these species. Note that the position of the ZNGI for essential resources is determined by the R^* values for each species. Each species should increase for resource availabilities in the shaded region of the figure, and should decrease for resource availabilities in the unshaded region of each figure.

Пороговая концентрация для двух незаменимых ресурсов

