

Южная Америка

Южная Америка — континент, пересекаемый экватором, площадью 18,13 млн км², большая часть которого расположена в Южном полушарии. Южная Америка расположена между Тихим океаном и Атлантическим океаном



Животный мир Южной Америки



Животный мир Южной Америки отличается исключительным богатством и разнообразием форм. В Южной Америке обитает около $1/4$ видов птиц всего земного шара, что в 2,5 раза больше, чем в Палеарктике. Разнообразие современных природных условий является первой предпосылкой, определяющей богатство животного мира Южной Америки.



Уакари — небольшие обезьяны. Длина их тела 45—48 см, а пушистого хвоста — треть всего тела. Это единственные короткохвостые обезьяны Южной Америки. Живут они в лесах Амазонии, в кронах высоких деревьев. На землю почти не спускаются. Шерсть у них мягкая, длинная, шелковистая.



Оцелот — хищник из рода кошачьих. Очень редкий зверь, занесен в Красную книгу. Размером он 1 метр да хвост 40 см. Живет на лесных склонах Анд, на высоте до 4 км. Встречается у самой кромки снегов

Капибара — самый крупный в мире грызун. Тело его покрыто жесткой щетиной. На пальцах — плавательные перепонки: капибара отлично плавает и ныряет. Живет по берегам рек, там, где высокая трава. Ест водные растения..





Шиншилла — грызун с мягкой, густой и прочной шерстью.

Это небольшой зверек с повадками кролика. Живет на границе

Перу и Чили, на высоте 3—6 км, в расщелинах скал



Гривистый волк — родственник собаки. Живет в пампасах и на окраинах болот, среди высокой травы. Охотится на птиц, мелких животных, насекомых. Ест фрукты и другую растительность.

Андский кондор — огромная птица: размах крыльев у нее чуть меньше 3 м. Живет в горах, на высоте до 5 тыс. м, а иногда и выше. Держатся кондоры стаями, но когда приходит время заводить птенцов, объединяются в пары.





Ламантин — водный зверь тропиков и субтропиков. На лапах у него плоские ногти-копытца. С их помощью ламантин ползает по дну и переворачивается с боку на бок. Он может зажать между лапами водные растения и поднести их ко рту. Мать очень привязана к своему детенышу: прижимает его к себе лапами и не покидает, даже если ей самой грозит опасность.

Растительный мир Южной Америки





**Дождевые
тропические леса
- сельва -
уникальная
экосистема
Южной Америки**

Климат в дождевом лесу самый ровный на планете и не изменяется в разные времена года

В сельве на двух - трех га можно встретить до 150 видов древесных растений.

К сожалению, сейчас в бассейне Амазонки леса усиленно вырубаются.



Бесценный млечный сок бразильско й гевеи

**Бесценный млечный сок бразильской гевеи –
основной источник получения натурального
каучука.**

**Не будь его, учёные ещё долго бы искали пути
изготовления такого незаменимого ныне
материал, как резина .**



**Бутылочное дерево
характерно для
тропических
редколесий на С.-В.
бразильского
платогорья.**

**Стволы некоторых
из них имеют
несколько метров в
поперечнике.**



**Лист удивительного
цветка Амазонки -
виктории регии -
может выдержать
ребёнка весом до 35
кг.**

**Русский ботаник Николай Иванович
Вавилов (1923-1933 годы) во время своих
экспедиций на материк установил, что
родиной происхождения таких растений
как фасоль, томаты, арахис, ананас и
картофель является Южная Америка**



Tim Holt/Photo Researchers, Inc.
© 1988-2000 Microsoft and/or its suppliers. All rights reserved.

**Экваториальные
леса сменяют
высокотравные
пальмовые
саванны.**

**На распаханных землях
саванн выращивают не
только уже названные
выше растения, но и
бананы (2/3 мирового
урожая), родиной
которых является
Индия).**

