

# Квадратные корни

Работа ученика 8 класса «Г»

МОУ – Лицей № 2

Октябрьского района г.Саратова

*Маловецкого Максима.*

Руководитель

*Седова Вера Викторовна.*

# Цель работы:

1. Познакомить зрителей с определением квадратных корней.
2. Познакомить зрителей с некоторыми теоремами, связанными с квадратным корнем.
3. Узнать, где применяются квадратные корни.

# Определение квадратного корня

# Свойства квадратного корня:

Величина корня не изменится, если его показатель увеличить в  $n$  раз и одновременно возвести подкоренное значение в степень  $n$ .

Величина корня не изменится, если показатель степени уменьшить в  $n$  раз и одновременно извлечь корень  $n$ -й степени из подкоренного значения.

Корень из произведения нескольких сомножителей равен произведению корней той же степени из этих сомножителей.

# Свойства квадратного корня:

Обратно, частное корней равно корню от частного

Чтобы возвести корень в степень, достаточно возвести в эту степень подкоренное значение

Обратно, чтобы извлечь корень из степени, достаточно возвести в эту степень корень из основания степени

# Свойства квадратного корня:

При условии равных показателей корней , корень от частного равен частному от деления корня из делимого на корень из делителя

Обратно, произведение корней одной и той же степени равно корню той же степени из произведения подкоренных значений


# Квадратный корень

Наверное много людей ,для того что бы извлечь квадратный корень применяют калькулятор. Но как известно на ЕГЭ применять калькулятор запрещено. Да и что делать если калькулятор остался дома?

Оказывается что способы извлекать квадратные корни придумали еще в пятом веке до нашей эры, продолжают придумывать по сей день.



# Один из способов нахождения квадратных корней



Я познакомлю вас со способом, который был изобретен в пятнадцатом веке.


Сначала найдём случай, когда корень извлекается нацело. Например,  $\sqrt{294849}$ . Разобьём цифры, входящие в это число справа налево на группы по две цифры. Самую левую назовём первой, следующую – второй и так далее. Общее число образовавшихся групп определяет число цифр искомого корня.







# Один из способов нахождения квадратных корней



- На место единиц ставим самую большую цифру  $a$ , для которой разность  $448 - 10a \times a$  положительна или равна нулю. Ясно, что в нашем случае это цифра 4. Заносим эту цифру в ответ.
- Умножаем 104 на 4 и записываем результат справа от вертикальной черты. Вычисляем разность:  $448 - 416 = 32$  и сносим к ней следующую группу. В результате получаем число 9249.

- Первая цифра находится как целочислительное значение корня из первой группы с недостатком. В нашем случае – это цифра 5. Записываем её в ответ. Затем возводим в квадрат, вычитаем из первой группы и сносим к результату вычитания в следующую группу. Если результат вычитания – нуль, то просто сносим следующую группу.
- Переходим к определению второй цифры. Для этого слева от полученного числа 448 проводим вертикальную прямую и записываем за ней на место десятков удвоенную первую цифру, в нашем случае это  $2 \times 5 = 10$ .



рис. 12)




рис. 18)





# Один из способов нахождения квадратных корней



- Третья цифра находится так же, как и вторая:  $54 \times 2$  и полученный результат (число 108) записываем слева от вертикальной черты на место десятков. На место единиц ставим самую большую цифру  $b$ , для которой разность  $3249 - 108b \times b$  положительна. Подбором убеждаемся, что  $b=3$  эта разность равна нулю. Заносим  $b=3$  в ответ.
- Умножаем 1083 на 3. Записываем результат справа от вертикальной черты и вычитаем его из 3249. Так как разность равна нулю, процесс вычисления корня окончен.



рис. 16)

A tomato is positioned above a yellow ruler. The ruler displays a simple square root calculation:  $\sqrt{29\ 48\ 49} = 5$ . The calculation shows  $29$  over  $25$  and  $48$  over  $48$ .

рис. 1e)

A tomato is positioned above a yellow ruler. The ruler displays a complex square root calculation:  $\sqrt{29\ 48\ 49} = 543$ . The calculation shows  $29$  over  $25$ ,  $48$  over  $48$ , and  $49$  over  $49$ . To the left of the calculation, the numbers  $104$ ,  $104$ , and  $108$  are written vertically.

рис. 1ж)

A carrot is positioned above a yellow ruler. The ruler displays a complex square root calculation:  $\sqrt{29\ 48\ 49} = 543$ . The calculation shows  $29$  over  $25$ ,  $48$  over  $48$ , and  $49$  over  $49$ . To the left of the calculation, the numbers  $104$ ,  $104$ , and  $108$  are written vertically.



# Один из способов нахождения квадратных корней

рис. 8

$$\sqrt{2} = \sqrt{2,00\ 00\ 00} = 1,414213$$

|        |           |
|--------|-----------|
| x 24   | 1 00      |
| x 4    | - 96      |
| <hr/>  |           |
| x 281  | 4 00      |
| x 1    | - 2 81    |
| <hr/>  |           |
| x 2824 | 1 19 00   |
| x 4    | - 1 12 96 |
| <hr/>  |           |
| 6 04   | 2828      |
| 6040   | 0,213     |
| -5656  |           |
| 3840   |           |
| -2828  |           |
| 10120  |           |
| -8484  |           |
| 1636   |           |

- Данный способ универсален. А значит с его помощью можно извлечь квадрат даже из 2.

# Способ извлечения квадратных корней С В Ивановой

- Извлечение квадратного корня — часто встречающаяся операция при решении задач элементарной математики. Помимо традиционных способов нахождения корней из натуральных чисел (например, изложение числа, стоящего под корнем, на множители) можно также использовать и способ, основанный на применении формулы квадрата суммы.
- В основе этого способа лежит идея представления  $\sqrt{A}$  в виде суммы двух слагаемых  $a + b$ , так, что квадрат первого слагаемого ( $a^2$ ) немного меньше  $A$ . При этом
  - $A = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
  - где  $a$  — некоторое фиксированное нами число и  $a^2 < A$ .
- Поскольку для пары произвольных натуральных чисел  $A$  и  $a$ ,  $A > a^2$  справедлива теорема о делении с остатком, то
- Если же  $A$  - квадрат натурального числа, для которого справедлива (1), то
  - $A - a^2 = 2a \cdot b + b^2$ ,  $b^2 < 2a$ . (2)
  - делитель частное остаток
  - Таким образом, для извлечения квадратного корня из числа  $A$  необходимо подобрать приближение  $a$  такое, что по формуле (2) можно найти  $b$ .
  - Описание алгоритма извлечения квадратного корня.
- 1. Подбираем приближение  $a$  числа  $\sqrt{A}$ .
- Для этого находим число разрядов  $a$  по формуле
  - где  $m$  — число разрядов  $A$ , а для
  - определения старшего разряда числа  $a$  отбрасываем четное число младших разрядов  $A$  так, чтобы остались один или два старших разряда. Обозначив полученное число выбираем однозначное число  $a_1$  такое, что  $a_1$ , есть наибольшее из чисел, удовлетворяющих условию  $a_1^2 < \text{или} = A_1$  В качестве старшего разряда берем  $a_1$  и получаем первое приближение в виде  $a_1 0 \dots 0$ . Имея первое приближе-
  - к цифр
  - ние, подбираем точное приближение, при этом шаг приближения  $h$  определяется из условия  $1^2 < 2a_1 h < (a_1 + 1)^2 - A_1$



# Способ извлечения квадратных корней С В Ивановой

- 2. Вычисляем  $A - a^2$ .
- 3. Выполняем деление с остатком (в столбик) на число  $2a$ .
- 4. Проверяем, является ли полученный остаток квадратом частного.
- Если нет, то исключаем возможность арифметической ошибки, проверяем правильность выбора приближения, после чего делаем вывод о том, что число  $A$  не является полным квадратом. Если же остаток является квадратом частного, то записываем ответ:
- $A = (a + b)^2$ .

# Способ извлечения квадратных корней С В Ивановой

- **Пример :** Найдите число, квадратом которого является число 4096.
- **Решение.** 1) Так как  $m = 4$ ,  $k = m + 1 - 2$ , то
- число разрядов  $a$  равно 2. Старший разряд числа  $a$  определяем из условия число разрядов  $a$  равно 2. Старший разряд числа  $a$  определяем из условия  $a^2 < \text{или} = 40$ , откуда следует, что  $a = 6$  и, значит,  $a = 60$ .
- 2)  $A - a^2 = 4096 - 3600 = 496$ .
- 3) 496 120 480
- 16
- 4) Поскольку  $16 = 4^2$ , то  $B = 4$  и
- $4096 = (60 + 4)^2 = 64^2$ .

# Теоремы, связанные с квадратным корнем

- Для квадратов чисел верны следующие равенства:

- $1 = 1^2$

- $1 + 3 = 2^2$

- $1 + 3 + 5 = 3^2$

- $1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$

и так далее.

# Квадратные корни

- К данному проекту я пришел не случайно. Началось все когда писал для себя таблицу квадратных корней. Заполняя таблицу я вдруг заметил закономерность “Разница между квадратными корнями равна сумме двух этих чисел” и решил доказать это убеждение.

# Теоремы, связанные с квадратным корнем

Разница между квадратными корнями равна сумме двух этих чисел

Ил  $\sqrt{4}$  и  $\sqrt{9}$   
и  $2^2$  и  $3^2$

- $9-4=5$
- $2+3=5$

$\sqrt{9}$  и  $\sqrt{16}$

Ил  $3^2$  и  $4^2$   
и

- $16-9=7$
- $3+4=7$

$\sqrt{16}$  и  $\sqrt{25}$

Или  $5^2$  и  $6^2$

- $25-16=9$
- $5+4=9$

$$(2n+1)^2 - (2n)^2 = 4n^2 + 4n + 1 - 4n^2 = 2n + 1 + 2n = 4n + 1$$

Следовательно Разница между 2 “соседними” квадратными корнями равна сумме чисел из которых они образованы

# Квадратные корни

Я показал свою теорему нашему учителю математики В В Седовой, которой очень понравилась эта тема. Я начал делать по этой теме проект, и нашел ещё одну закономерность “Разница между квадратными корнями 2 чисел, стоящих в порядковой разнице на 3 числа, РАВНА СУММЕ ЧИСЕЛ ИЗ КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И УДВОЕННОМУ ЧИСЛУ МЕЖДУ НИМИ”.

# Теоремы, связанные с квадратным корнем

Разница между квадратными корнями 2 чисел, стоящих в порядковой разнице на 3 числа, РАВНА СУММЕ ЧИСЕЛ ИЗ КОТОРЫХ ОНИ ОБРАЗОВАНЫ И УДВОЕННОМУ ЧИСЛУ МЕЖДУ НИМИ

$$\sqrt{4} \quad \text{И} \quad \sqrt{16}$$

$$16-4=12$$

$$2^2 \quad \text{И} \quad 4^2$$

$$2+3+3+4=2+(3*2)+4=12$$

$$\sqrt{9} \quad \text{И} \quad \sqrt{25}$$

$$25-9=16$$

$$3^2 \quad \text{И} \quad 5^2$$

$$3+(4*2)+5=3+8+5=16$$

$$\sqrt{16} \quad \text{И} \quad \sqrt{36}$$

$$36-16=20$$

$$4^2 \quad \text{И} \quad 6^2$$

$$4+6+5=20$$

Следовательно: ЧТд



# Квадратные корни

- Доказательства теорем на бумаге мне показалось недостаточным, и так как я учусь в информационно-технологическом классе, я решил написать програмку-калькулятор которая позволила бы мне убедиться в точности моей теоремы. Сейчас я вам её продемонстрирую.

# Выводы:

- Подавляющее число задач о пространственных формах и количественных отношениях реального мира сводится к решению различных видов уравнений. Овладевая способами их решения, мы находим ответы на различные вопросы из науки и техники (транспорт, сельское хозяйство, промышленность, связь и т. д.).
- Различные уравнения как квадратные, так и уравнения высших степеней решались нашими далекими предками. Эти уравнения решали в самых разных и отдаленных друг от друга странах. Потребность в уравнениях была велика. Уравнения применялись в строительстве, в военных делах, и в бытовых ситуациях.

# Список литературы

- 1 Научно-популярный физико-математический журнал “Квант”, - М., 1970.
- 2 Научно-теоретический и методический журнал “ математика в школе”, - М.: Школьная Пресса, 2003.

**Спасибо**

**за**

**внимание!**