

**Агиолакс® Пико**

**Agiolax®- Piko**

# Естественная легкость

## Agiolax®- Piko

Слабительное средство  
стимулирующего действия




# Состав Агиолакс® Пико

1 пастилка содержит :

- пикосульфат натрия 5 мг
- вспомогательные вещества:  
глицерол, желатин, крахмал кукурузный,  
смола гуаровая, лецитин, калия  
ацесульфам, ароматизатор сливовый.

# Натрия пикосульфат - химические свойства

Sodium picosulfate



4,4-(2-Пиколилиден)-дифенол сульфат,  
производное триарилметана

# Натрия пикосульфат – фармакологические свойства

Активная форма препарата (свободный дифенол), образуется путем гидролиза под влиянием кишечных микроорганизмов, непосредственно возбуждает нервные структуры кишечной стенки, усиливает перистальтику, в результате ускоряется продвижение кишечного содержимого, уменьшается всасывание электролитов и воды.

# Натрия пикосульфат – фармакологические свойства

- Слабительный эффект наступает через 6–12 ч после приема.
- При приеме внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.
- Действует только на уровне толстой кишки.

# Показания к применению Агиолакс® Гико

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки:

- при изменении характера питания и места пребывания,
- после операции,
- при длительном постельном режиме,
- беременности,
- нарушении обмена веществ,
- ожирении,
- тяжелом общем состоянии,
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
- вторичные запоры.

# Показания к применению Агиолакс® Гико

Регулирование стула при:

- геморрое,
- проктите,
- трещинах ануса



# Показания к применению Агиолакс® Пико

Подготовка:

- к хирургическим операциям,
- инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

## Форма выпуска

- Агиолакс®- Пико пастилки 5 мг № 10
- Срок годности 3 года
- Хранить при температуре не выше 25 С
- Хранить в недоступном для детей месте
- Разрешен к применению с 4-х лет
- Во II и III триместрах беременности и в период кормления грудью использовать по назначению врача.

# Схема применения Агиолакс® Пико

- Для лечения острого запора у взрослых – 5 мг (1 таблетка).
- Для лечения хронического запора у взрослых – начальная доза 15 мг (3 таблетки), снижение дозы до 2,5 мг (1/2 таблетки).
- Для лечения запора у детей с 4-х лет – 1/2 таблетки.
- Препарат принимают 1 раз в сутки, лучше вечером.
- Применение препарата более 2 недель без перерыва требует дополнительной консультации врача

# Противопоказания

- гиперчувствительность к натрия пикосульфату или другим ингредиентам препарата;
- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- абдоминальные боли неясного генеза;
- тяжелая дегидратация;
- кровотечения из ЖКТ;
- цистит;
- спастический запор.

# Побочные эффекты при длительном применении не по назначению

- Боль в животе, диарея, позывы к рвоте, при длительном ежедневном применении — нарушение водно-электролитного баланса, слабость, судороги, понижение АД.
- Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами – не обнаружено

# Взаимодействия с другими средствами

- антибиотики широкого спектра действия уменьшают послабляющий эффект;
- диуретики и глюкокортикоиды повышают вероятность возникновения водно-электролитного дисбаланса;
- возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам.

## Клинические исследования

- 128 беременных с функциональными запорами.  
Результат: нормализации содержания кишечной и генитальной микрофлоры, а также проницаемости кишечника и снижению развития различных осложнений во время беременности, родов и послеродового периода.<sup>1</sup>
- НП эффективен в устранении запоров у онкологических больных, получающих большие дозы опиоидов (применялся в дозе 2,5–15 мг/сут)<sup>2</sup>

1. Халиф И.Л., Подзолкова Н.М., Конович Е.А., Назарова С.В., Гвасалия А.Г.  
Влияние запора у беременных на состояние кишечной и генитальной микрофлоры и проницаемость кишечника // Российские медицинские вести 2004 г., №1, с. 43–47

2. Stewart. Study No CT588 Doc. No U94–0226. 1994.

# Клинические исследования

Эффективность подготовки к проведению рентгеноконтрастного исследования кишечника

- Рандомизированное проспективное исследование 435 пациентов, 4 группы.  
1- бисакодил + очистительная клизма, 2 - НП, 3 - НП + диета, 4 – диета + сеннозиды.

Результат: Режим, включающий в себя простые инструкции по диете и слабительные средства, оказался таким же эффективным, как и предварительная очистительная клизма.

- Рандомизированное проспективное исследование 150 человек, 3 группы.  
1 - НП (20мг), 2 - НП (20мг) + диета, 3 - ПЭГ 236г.

Результат: строгая диета не увеличивала эффективности НП, его применение было диагностически успешным в 80% случаев.



# Какие врачи используют в назначениях слабительное средство Агиолакс® Пико

Терапевты

Гастроэнтерологи

Гериатры

Эндокринологи

Гинекологи

Педиатры

Хирурги

Врачи стационаров

Врачи функциональной диагностики

# Показания

## Агиолакс® Пико

- запоры у пожилых людей  
(при изменении характера питания и места пребывания, при длительном постельном режиме, нарушении обмена веществ, ожирении, тяжелом общем состоянии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, вторичные запоры);
- запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (после операции, при длительном постельном режиме);

# Показания

## Агиолакс® Пико

- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям;
- запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки при беременности;
- запоры у детей;
- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса).

## Преимущества Агиолакс® Пико

- Дозировка, которая подходит 98,8% пациентов
- Нормализует частоту и консистенцию стула
- Действие через 6-12 часов гарантирует прогнозированное действие и естественный физиологический эффект
- Применяется при острых и хронических запорах
- Удобная форма приема, приятный вкус для детей
- Пастилка имеет разделительную риску – гарантирует точность дозировки
- Не вызывает привыкания в течении 12 месяцев применения
- Не вызывает побочных эффектов при правильном применении