

Связь непрерывности и дифференцируемости функций.

Теоремы о производных суммы, произведения и частного, их следствия и обобщения.

Теорема. Если функция дифференцируема в точке x_0 , то она непрерывна в этой точке.

- Доказательство. Пусть $\exists f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$
- Тогда , $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = f'(x_0) \cdot 0 = 0$
- следовательно, $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , ч. т. д.
- Таким образом, **дифференцируемость функции в точке является достаточным условием непрерывности функции в этой точке**, то есть, **если функция разрывна в точке x_0 , то она в ней не дифференцируема!**

$$x^2 - 1$$

- Примеры. 1) Функция $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ не дифференцируема в точке $x_0 = 1$, так как она не определена в этой точке, следовательно, разрывна.
- 2) Функция $f(x) = \sqrt{x}$ не дифференцируема в точке $x_0 = 0$, так как она в ней разрывна (хоть и определена!).
- Почему дифференцируемость функции в точке не является необходимым условием непрерывности в этой точке?
- [Функции $f(x) = |x|$ и $h(x) = \sqrt[3]{x}$
- **непрерывны в нуле, но не дифференцируемы]**

- **Теорема. Пусть существуют $f'(x)$ и $g'(x)$. Тогда существуют производные их суммы, произведения и частного, причем:**
 - 1) $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$;**
 - 2) $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$;**
 - 3) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$,если $g(x) \neq 0$.**

Доказательство по определению:

■ Пусть $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ тогда

$$\Delta h(x) = \frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x) \cdot g(x)}$$

$$\frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x) \cdot g(x)} = \frac{g(x)\Delta f(x) - f(x)\Delta g(x)}{g(x+\Delta x) \cdot g(x)}$$

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta h(x)}{\Delta x} = \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x) \cdot \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} - f(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x}}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (g(x+\Delta x) \cdot g(x))} = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$$

3) $h(x) =$

- 1) Найдите: $f'(x)$; $f'(\pm 1)$; значения x | функция не дифференцируема $f(x) = \frac{5x^2 + 2}{4x}$

- 2) $g(x) = (3 + x)(2 - \sqrt{x + x^2})$. Найдите: $g'(x)$

3) $h(x) = \frac{ax + b}{cx + d} = \frac{C}{P_2(x)}$. Докажите, что $h'(x)$

- 4) $f(x) = \frac{2x^2 \sqrt{x}}{x+1}$. Найдите $f'(x)$. При каких значениях x $f'(x) > 0$? При каких

- **Домашнее задание:** теорема о связи непрерывности и дифференцируемости; теоремы о вычислении производных (с доказательством);
В.: 1) №409 (1, 2); №414 (2, 4); №416; №431 (1).
- 2) $f(x) = \frac{5x - \sqrt{x}}{2x + 2}$
- Найдите: $f'(x)$; $f'(4)$; значения x , при которых функция не дифференцируема .