



1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом





**ВИЧ – вирус
иммунодефицита
человека**

СПИД


ВИЧ

**СПИД – синдром
приобретенного
иммунодефицита**

ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ



Первым образцом крови, в котором обнаружены антитела к ВИЧ, была кровь, полученная от африканского донора в 1959 году



Далее ВИЧ был найден в крови, которую доноры из Африки сдавали в начале 70-х годов



СПИД возник на африканском континенте и в дальнейшем распространился в Европе и Америке.

Среди лиц пожилого возраста, а также детей от 5-6 до 13-15 лет случаев ВИЧ-инфекции не регистрировалось.

Теория

Все это свидетельствовало о недавнем появлении заболевания в Африке.




Вирус был получен в одной из секретных военных лабораторий методом генной инженерии из фрагментов двух вирусов

Теория?

Структура вируса имеет высокую степень сродства с природными компонентами ретровирусами. Поэтому «пентагоновская» версия несостоятельна

Большинство специалистов склоняются
к версии о природном происхождении
вируса.

Теория 3



До сих пор не существует вакцин для профилактики СПИДа и недостаточно эффективны методы лекарственной терапии этого заболевания.

Основная проблема создания лекарственных препаратов заключается в высокой изменчивости структуры и свойства ВИЧ






Впервые в научной литературе появилось сообщение, что в США выявлены больные с поражением иммунной системы, которое сопровождается рядом редких болезней.

1981 ГОД.

Первооткрывателями вируса стали *Люк Монтанье* (Франция) и *Роберт Галло* (США). В 1983 году (всего лишь через два года после выявления первых случаев болезни) из лимфатического узла больного СПИДом был выделен вирус — возбудитель СПИДа



Средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека составляет приблизительно 12 лет, однако современные препараты увеличивают эту цифру в 2-3 раза.



Современные препараты для лечения СПИДа действуют внутри клетки, не позволяя ВИЧ размножаться.



передается...

Половым путем

Во время беременности

Через бытовой контакт

С материнским молоком

При создании татуировок
и пирсинга



Через совместное
использование
одноразового шприца

Воздушно-
приональном в
Через укусы насекомых
кровь (допоросное
вливание)

Мать и дитя...

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку без какого-либо вмешательства составляет 20–45%.

При проведении соответствующего лечения этот риск можно снизить до 1-2%.



Наркомания

От общего количества ВИЧ – инфицированных, наркоманы составляют 88%

В РФ 450 тыс. молодых людей с двойным диагнозом – ВИЧ-наркомания...


52% заражений ВИЧ происходит «через шприц»...



Стистика...



Ежедневно заражается
более 5 000 человек,
что дает основание
говорить о пандемии
СПИДа.



В настоящее время **число ВИЧ-инфицированных в мире превышает 30 млн, а умерших от этой болезни — 6 млн. человек.**




Украина по темпам развития эпидемии ВИЧ-инфекции занимает **2-е место в Европе и 5-е — в мире.**



Украина по
темперам роста
заболеваемости
и обгоняет
даже Африку

За 2007 год у нас зарегистрировано 9000 новых случаев
инфицирования ВИЧ.

Это почти на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом



При нынешних
темперах развития
заболевания в 2014
году от СПИДа в
Украине ежедневно
будет умирать 140
человек.

Всемирная акция





Благотворительные концерты





Социальная реклама

Flyers were distributed to
on-lookers simultaneously

Украшения



novate.ru

HUMANISATION CLOTHES

RIGHT INTEGRATION

PREJUDICE KIDS ON THE WORLD

INTEGRATION



bət[✓]blt

Выставки-презентации

