

презентация



Кузьмина Жанна Александровна



# ПТИЦЫ

## ■ Дикие

- ГОРОДСКИЕ
- ЛЕСНЫЕ
- ГОРНЫЕ
- ВОДОПЛАВАЮЩИЕ
- ПЕРЕЛЕТНЫЕ
- НЕПЕРЕЛЁТНЫЕ

## ■ Домашние

- ДЕКОРТИВНЫЕ
- НЕДЕКОРАТИВНЫЕ



## ГОРОДСКИЕ

Семейство птиц отряда голубеобразных (Columbiformes). Размеры преимущественно средние, лишь у венценосных голубей - крупные (длина тела до 80 см). Окраска у Г. разнообразная. Полёт лёгкий, быстрый. 255 видов, широко распространены в умеренных и тропических областях всего земного шара; наиболее разнообразны и многочисленны на Ю.-В. Азии, в Австралии и на прилежащих СТРОВАХ.

## ЛЕСНЫЕ

Семейство лазающих птиц (Scansores), лесн. птицы с коренастым телом. прямым, долотообразно заостренным на верхушке клювом и жестким хвостом, которым они упираются при лазании по деревьям. Распространены по всему земному шару, за исключением Австралии и Мадагаскара. Питаются насекомыми и их личинками, живущими под корою деревьев



## Птицы водоёмов



Малый лебедь – характерный обитатель тундр Северо-Сибирской низменности, Таймыра и Гыдана. Южнее местами гнездится и в лесотундре. В начале текущего столетия малый лебедь в значительном количестве населял Бреховские острова в устье р. Енисея. Факты его размножения отмечены на Норильских озерах и в долине р. Енисея в зоне лесотундры

# горные



На Дальнем Востоке России гнездование хохлатого орла установлено только в юго-зап. р-нах Приморского края - в вост. отрогах Борисовского (Шуфанского) плато, расположенного в пограничных с Китаем Восточно-Манчжурских горах .

# перелётные



Перелётные птицы совершают регулярные сезонные перемещения между местами гнездовий и местами зимовок. Переселения могут совершаться как на близкие, так и на дальние расстояния. По мнению орнитологов, средняя скорость перелёта для мелких птиц составляет порядка 30 км/час, а для крупных около 80 км/час. Часто проходит в несколько этапов с остановками для отдыха и кормления.

# неперелётные



**Черный дрозд был замечен в использовании инструментов: с помощью хворостинок эти птицы расчищают снег, чтобы добраться до пищи. А имеющий репутацию вегетарианца снегирь может вести себя как стервятник, поедая останки кур и уток, если на карту поставлено его выживание.**



# ДЕКОРАТИВНЫЕ



Характерным признаком самца  
Характерным признаком самца,  
является сильное развитие  
верхних кроющих перьев  
Характерным признаком самца,  
является сильное развитие  
верхних кроющих перьев хвоста  
(ошибочно принимаемых за  
хвост).

Длина тела 100—125 см, хвоста  
40—50 см, удлинённых,  
украшенных «глазками» перьев  
надхвостья 120—160 см. Самец  
весит 4—4,25 кг.

Голова, шея и часть груди  
синие, спина зелёная, низ тела  
чёрный. Самка мельче,  
окрашена скромнее и лишена  
удлинённых перьев надхвостья

# НЕДЕКОРАТИВНЫЕ



Куры домашние - ,  
происходят от диких  
банкивских кур. Наиболее  
многочисленный вид  
сельскохозяйственной  
птицы. Основные породы:  
леггорны, плимутрок белый,  
род-айланд, московская,  
ню-гемпшир, корниш и др.  
Живая масса кур яичных  
пород 1,8-2,2 кг, петухов  
2,5-3 кг; мясных - 3-3,7 и  
3,8-4,5 кг; средняя годовая  
яйценоскость яичных пород  
220-280 яиц. Разводят на  
всех континентах.