



КУРСОВИКА



Табак

Латинское название
Nicotiana glauca
Род семейства
тропический

и

ка



НИКОТИН-ЭТО ЯД

Никотин - желтоватая
вкуса, растворимая
жире, хорошо всасыва
слизистыми оболоч
неповреждённой ко
Смертельная его доза
грамм на 1 кг массы



Табачный дым

Вредные вещества содержащиеся в табачном дыме:

- Бензпирен – вызывает злокачественное перерождение тканей, образование опухолей;
- Синильная кислота;
- Формальдегид;
- Сероводород;
- Аммиак;
- Угарный газ;
- Ионы тяжёлых металлов (свинца, висмута, радиоактивного полония – 210).



Курение в Беларуси

28,2% курят

в возрасте 20-29 лет - 38,1%

в возрасте 30-39 лет - 37,4%

Среднее количество выкуриваемых сигарет в день - 20

Мужчины-54,4%

в возрасте 30-39 лет – 64,8%

Женщины-8,3%

в возрасте 30-39 лет – 14,9%



Пассивное курение

- В мире пассивными курильщиками являются миллиарды детей в возрасте до 14 лет
- 55% подростков в возрасте 13-15 лет подвержены воздействию табачного дыма дома
- 73% подростков в возрасте 13-15 лет подвергаются воздействию табачного дыма в общественных местах

