


НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ


Сперанская О.И.
ФГУ ГНЦ ССП РОСЗДРАВА

Структура синдрома ТЗ



ИДЕАТОРНАЯ ФОРМА ТЗ


- При идеаторной форме ТЗ преобладает идеаторный компонент влечения к курению табака – мысленное желание курения.
- Соматовегетативные расстройства выражены слабо, практически игнорируются пациентами
- Собственно невротической компонент отсутствует, преобладает депрессивно-ипохондрическая, астено-ипохондрическая симптоматика
- Частичная декомпенсация психической деятельности мозга 2 ст. или полная



- сомато-вегетативный компонент
- невротический компонент
- идеаторный компонент


ДИССОЦИИРОВАННАЯ ФОРМА ТЗ

- Соматовегетативный компонент преобладает
- Идеаторный и невротический компоненты выражены в два раза слабее, примерно в равной степени.
- Психическая деятельность мозга компенсирована, или же имеет место декомпенсация 1 степени




ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ФОРМА ТЗ

- ❖ Одновременное сочетанное мощное проявление всех компонентов ТЗ , с некоторым преобладанием идеаторного компонента.
- ❖ Декомпенсация психической деятельности мозга 2 степени или полная декомпенсация психической деятельности мозга




ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ФОРМА ТЗ

- ❖ Одновременное сочетанное мощное проявление всех компонентов ТЗ , с некоторым преобладанием идеаторного компонента.
- ❖ Декомпенсация психической деятельности мозга 2 степени или полная декомпенсация психической деятельности мозга




ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ФОРМА ТЗ


- ❖ Одновременное сочетанное мощное проявление всех компонентов ТЗ , с некоторым преобладанием идеаторного компонента.
- ❖ Декомпенсация психической деятельности мозга 2 степени или полная декомпенсация психической деятельности мозга




. Идеаторная форма ТЗ. Основная группа.




. Диссоциированная форма ТЗ. Основная группа.




. Психосоматическая форма Т3. Основная группа.



. Диссоциированная форма ТЗ Сочетанная терапия БРТ и пиразидолом.



.Прихосоматическая форма ТЗ. Сочетанная терапия БРТ и пиразидолом.



основными симптомами-мишенями терапевтического действия психотерапии при табачной зависимости являются вегетативно-сосудистые и невротические расстройства в структуре СПВК, а также симптоматика тревожно-депрессивного и ипохондрического ряда, коморбидная табачной зависимости,

Практически не затронутым в процессе терапии остается идеаторный компонент патологического влечения к курению

биорезонансная терапии (БРТ)-
возможность воздействия на
биологически активные
системы организма (БАС),
отвечающие за реализацию
идеаторного компонента ПВК