


Обезьяны.

Выполнили Андреевы Дмитрий и Максим.



Мартышки.



Мартышки относятся к приматам. Существует около сотни видов мартышек, которые делятся на две основные группы. Мартышки Западного полушария обитают в Южной Америке и способны хвататься хвостом за ветки и различные другие предметы. Мартышки Восточного полушария живут в Африке и хвататься хвостом не могут. Уакари живут маленькими группами в дождевых лесах Амазонки в Южной Америке; они питаются плодами и мелкими животными. Мохнатые мартышки также обитают в Западной полушарии, в амазонских дождевых лесах. Они живут группами высоко на деревьях, где находят пищу — фрукты и листья. В каждой группе насчитывается около 60 особей.

Львинохвостая макака живёт в Индии, то есть относится к мартышкам Восточного полушария. В мангровых топях Борнео обитает носач. Большой нос самца-носача, вероятно, служит для усиления его громкого крика. У самок нос гораздо меньше, а голос гораздо тише.



Уакари




Львинохвостая макака





Мохнатая мартышка.



Носач

ЛЕННИВЦЫ.



Двупалый ленивец (с двумя пальцами на каждой лапе) живет в лесах северной части Юж. Америки. Он проявляет активность только по ночам, лазает по ветвям в поисках пищи - плодов и листьев. Трёхпалый ленивец (с двумя пальцами на передних лапах и с тремя на задних) размерами меньше двупалого и обитает на более обширной территории в Южной Америке. Оба вида ленивцев передвигаются очень медленно. Считается, что они могут развивать скорость не более 0,15 км/ч.

Однако, если на ленивца нападут он может защититься с помощью когтей. Их шерсть покрыта водорослями (микроскопическими растениями) и из-за этого кажется зелёной.



Гориллы




Гориллы - самые большие из приматов. Рост гориллы может достигать 1,7 м, а вес - 210 кг. Они необычайно сильны и способны отрывать от деревьев толстые ветви. Если гориллу потревожить, она поднимается на задние лапы и бьёт себя в грудь, устрашающе рыча. Если чужак не убрался, горилла надвигается на него, ломая растительность и издавая гневные вопли. Большинство чужаков немедленно удирают в испуге.

Однако горилла редко бывает опасной. Она предпочитает спокойно жить в дождевых лесах Западной Африки, питаясь плодами, листьями и молодыми ростками.

Обычно гориллы живут семейными кланами, внутри клана царит порядок благодаря сложной системе отношений и строгой иерархии.

Возглавляет группу старый самец; возраст некоторых достигает 40 лет

Гориллы редко нападают на людей. Они становятся опасны только в том случае если их пугают или пытаются поймать.





Орангутаны.





Орангутаны живут в густых лесах Суматры и Борнео. С помощью сильных передних и задних лап они ловко карабкаются по деревьям в поисках фруктов, семян и иногда птичьих яиц. На ночь орангутан устраивает себе гнездо из веточек высоко на дереве; в этом гнезде он и спит. Ростом орангутан примерно 1,5 м, и когда он стоит прямо, его передние лапы достают до коленных суставов.





ШИМПАНЗЕ.



Шимпанзе обитают в лесах и лесистых равнинах Центральной Африки. Они живут группами до 30 особей, имеющими общественную структуру. Они могут использовать различные предметы для своих целей; считается, что шимпанзе - самые умные из обезьян.

Рост шимпанзе около 1,6 метра; у них тонкие, но мускулистые передние и задние лапы. Дневное время они проводят передвигаясь по своей территории в поисках плодов и орехов. Часто шимпанзе устраивают гнёзда из веток и листьев и спят в них ночью.



