# Астрономические системы отсчета и методы их построения

#### Основные Элементы:


- Общая Теория Относительности (или альтернативная теория гравитации)
- Калибровочная свобода
- Мультипольные гравитационные поля
- Пост-Ньютоновские приближения
- Асимптотические сшивки полей
- Теория систем отсчета: резолюции МАС 2000
- Теория прецессии и нутации МАС 2000
- Компьютерные коды: NASA GEODYNE, Orbit Determination Program, CALC VLBI, etc.

## Существующие стандарты

- Общая Теория Относительности резолюции МАС 2000
  - Устраняет нефизические степени свободы из наблюдаемых величин
  - Адекватная интерпретация гравитационных экспериментов
- Параметризованный пост-Ньютоновский (ППН) формализм морально устарел, требует модернизации. Причина:
  - Нединамичен
  - Системы отсчета не разработаны
  - Нековариантен
  - Калибровочные степени свободы перепутаны с физическими эффектами
  - Не вполне адекватен в интерпретации гравитационной физики и тестов ОТО

## Параметризованная теория систем отсчета:

- Ковариантна
- Калибровочно-инвариантна
- Оперирут непосредственно с наблюдаемыми величинами
- Исключает калибровочнозависимые решения и эффекты



## Калибровочная свобода электродинамики

• Полевые переменные эл.-эм. поля

$$\overset{\mathbb{N}}{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t} - \overset{\mathbb{N}}{\nabla} \varphi$$

$$H = \nabla \times A$$

• Калибровочное преобразование

$$\varphi' = \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$

$$A' = A + \nabla \varphi$$

• Калибровочная инвариантность эл.-эм. поля

$$\overset{\mathbb{M}}{E}' = -\frac{1}{c} \frac{\partial A'}{\partial t} - \overset{\mathbb{M}}{\nabla} \varphi' = \overset{\mathbb{M}}{E}$$

$$H' = \nabla \times A' = H$$

# Полевые переменные в гравитодинамике

- Метрический тензор

$$g_{\mu\nu}(t,x)$$

- Афинная связность

$$\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu}(g_{\beta\gamma};g_{\beta\gamma,\lambda})$$

- Тензор кривизны

$$R^{\alpha}_{\beta\mu\nu}(\Gamma^{\alpha}_{\beta\mu};\Gamma^{\alpha}_{\beta\mu,\nu})$$

# Калибровочная инвариантность гравитодинамики

$$x'^{\alpha} = x^{\alpha} + \xi^{\alpha}$$

$$g'_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \frac{\partial \xi_{\mu}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \xi_{\nu}}{\partial x^{\mu}}$$

*R* инваривантен!

## Гармоническая калибровка и «остаточная» калибровочная свобода

• Гармонические условия

$$\gamma^{\mu\nu} \boxtimes \sqrt{-g} g^{\alpha\beta} - \eta^{\mu\nu}$$

$$\frac{\partial \gamma^{\mu\nu}}{\partial x^{\mu}} = 0$$


• Уравнения Эйнштейна

$$\mathbb{Z}\gamma^{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} \left(T^{\mu\nu} + \Lambda^{\mu\nu}\right)$$

• «Остаточная» калибровочная свобода

$$x^{\mu} = x^{\mu} + \xi^{\mu} \implies \frac{\partial \gamma^{\mu\nu}}{\partial x^{\mu}} = 0 \implies \mathbb{Z}\xi^{\mu} = 0$$

# Калибровочная свобода в релятивистской задаче трех тел





Граница локальной системы отсчета Земля-Луна  $w^{\mu} = (u, w)$ 

### Калибровочные степени свободы гравитационного поля в системе Земля-Луна

 $\gamma_{\text{Солнце}}^{\mu\nu} = \pi$ риливное тензорное поле с 2 степенями свободы)

 $\xi^{\mu} = \text{к}($ алибровочное векторное поле с 4 степе нями свободы)

$$\xi^{0} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} B_{\text{мак.ак}}(u) w^{< a_{b}} w^{a_{2}}_{0} ... w^{a_{b}}_{0} = B(u) + B_{a}(u) w^{a} + \frac{1}{2} B_{ab}(u) \left( w^{a} w^{b} - \frac{1}{3} r^{2} \delta^{ab} \right) + \dots$$
 гармонический полином степени  $l$  тензор ранга  $l$ 

$$\xi^{i} = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l!} D_{\langle ia_{1}a_{2}...a_{l} \rangle}(u) w^{\langle a_{1}} w^{a_{2}}...w^{a_{l} \rangle} + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l!} E_{\langle a_{1}a_{2}...a_{l} \rangle}(u) w^{\langle i} w^{a_{1}} w^{a_{2}}...w^{a_{l} \rangle} + \varepsilon_{ipq} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(l+1)!} F_{\langle pa_{1}a_{2}...a_{l} \rangle}(u) w^{\langle q} w^{a_{1}} w^{a_{2}}...w^{a_{l} \rangle}$$

#### Примеры калибровочной свободы:

ТТ-ТСВ преобразование времени

$$\frac{dB}{du} = \frac{1}{2} v^2 + \frac{GM_{\text{Sun}}}{2} - Q_{\text{IAU}}$$

$$= \frac{1}{2} v^2 + \frac{GM_{\text{Sun}}}{2} - Q_{\text{IAU}}$$

- Лоренцево сокращение

$$D_{ij}(u) = \frac{1}{2}v^i v^j$$

- Эйнштейновское сжатие


$$E(u) = \gamma \frac{GM_{\text{Sun}}}{r} - Y_{\text{IAU}}$$

- Релятивистская прецессия (de Sitter, Lense-Thirring, Thomas)

$$\frac{dF_{ij}}{du} = -(1+2\gamma)\frac{GM_{\text{Sun}}}{r^3}v^{[i}w^{j]} - 2(1+\gamma)\frac{GM_{\text{Sun}}}{r^3}v^{[i}_{\text{Sun}}w^{j]} + v^{[i}Q^{j]} + R_{\text{IAU}}^{[ij]}$$

### Калибровочное сжатие орбиты Луны

Величина сжатия = 1 метр! Эллиптичность земной орбиты приводит к годовой осцилляции калибровочного сжатия = 2 мм.




## Являются ли калибровочные степени свободы наблюдаемыми?

- Эйнштейн: нет отсутствуют в наблюдаемых данных, не имеют отношения к физическим эффектам
- Нордведт: да отсутствуют в наблюдаемых данных, их отсутствие указывает на присутствие гравимагнитного поля (эффект «голого короля»)
- Kopeikin, S., Phys. Rev. Lett., vol. 98, id. 229001 (2007)
  - The LLR technique involves processing data with two sets of mathematical equations, one related to the motion of the moon around the earth, and the other related to the propagation of the laser beam from earth to the moon. These equations can be written in different ways based on "gauge freedom," the idea that arbitrary coordinates can be used to describe gravitational physics. The gauge freedom of the LLR technique shows that the manipulation of the mathematical equations is causing JPL scientists to derive results that are not apparent in the data itself.

#### Аберрация и сокращение размеров движущихся тел

В частности, это означает, что размер сферы, полученный при её фотографировании посредством параллельного пучка лучей, не будет зависеть от конкретного наблюдателя, и всегда будет равен размеру сферы на фотографии, сделанной в системе покоя сферы, то есть Δr'. Аберрация изменяет направление пучка лучей. Фотографическая пластинка должна быть поставлена так, чтобы лучи света падали на неё перпендикулярно. Протяженная двигающаяся сфера наблюдается как повернутая на некоторый угол (равный углу аберрации!); при этом сферы остается неизменным – то есть Лоренцево сокращение сферы не наблюдается!



Фотография движущейся сферы

# Калибровочные степени свободы в уравнениях Эйнштейна-Инфельда-Гоффмана для системы Земля-Луна:

• "Ньютоновские" преобразования релятивистской гравитационной 4-х силы


$$u = t$$

$$w^i = x^i - x_B^i(t)$$

- Устраняет все калибровочные степени свободы из преобразований координат!
- Переводит все калибровочные степени свободы в уравнения движения Луны вокруг Земли, где они появляются как фиктивные (ненаблюдаемые) силы

## Релятивистское сокращение размеров двигающихся небесных тел и его влияние на уравнения движения

Сферическая симметрия двигающегося небесного тела определена неоднозначно в глобальной системе координат вследствие сокращения Лоренца/Эйнштейна и других (нелинейных) координатных эффектов. Для определения физической формы двигающегося тела, необходима локально-инерциальная система координат.



# Пример: постулат сферической симметрии тел в глобальной системе координат приводит к появлению фиктивной пост-Ньютоновской силы (Брумберг 1972; Копейкин и Власов 2004)

$$\begin{split} F_{\text{Brumberg}}^{i} &= \epsilon^{2} G \sum_{C \neq B} \left\{ \frac{5 \left( \mathbf{M}_{B} \mathcal{I}_{C}^{(2)} + \mathbf{M}_{C} \mathcal{I}_{B}^{(2)} \right) v_{C}^{j} v_{C}^{k} R_{BC}^{< ijk >}}{2 R_{BC}^{7}} \right. \\ &+ \frac{G \left( \mathbf{M}_{B} \mathbf{M}_{C} \mathcal{I}_{B}^{(2)} - \mathbf{M}_{B}^{2} \mathcal{I}_{C}^{(2)} - 2 \mathbf{M}_{C}^{2} \mathcal{I}_{B}^{(2)} \right) R_{BC}^{i}}{3 R_{BC}^{6}} \\ &- \frac{G^{2}}{2} \sum_{D \neq B, C} \mathbf{M}_{C} \left[ \frac{\mathbf{M}_{B} \mathcal{I}_{D}^{(2)} R_{CD}^{k} R_{BD}^{< ik >}}{R_{CD}^{3} R_{BD}^{5}} \right. \\ &+ \frac{\mathbf{M}_{D} \mathcal{I}_{B}^{(2)}}{R_{BC}^{3}} \left( \frac{R_{CD}^{k} R_{BC}^{< ik >}}{R_{CD}^{3} R_{BC}^{2}} + \frac{R_{BD}^{k} R_{BC}^{< ik >}}{R_{BD}^{3} R_{BC}^{2}} + \frac{R_{BC}^{k} R_{BD}^{< ik >}}{R_{BD}^{5}} \right) \right] \right\} \; , \end{split}$$

#### Выводы:

- Калибровочная свобода в релятивистской гравитационной физике играет ключевую роль, но трудна для конкретного понимания
- Неправильное истолкование калибровочной свободы влечет:
  - появление нефизических эффектов в уравнениях движения;
  - неправильной интерпретации наблюдаемых данных;
  - предложение ошибочных гравитационных экспериментов;
  - нефизическую трактовку прецесии и нутации, неправильным выводам о внутренней структуре Земли и Луны;
  - неточностям в построении навигационных систем и геодезических координатных сетей;
  - ошибкам в прецезионной космической навигации в ближнем и дальнем космосе
- Внимательно изучаем труды классиков и осваиваем тонкости теорий, обладающих калибровочной свободой

#### Блок-схема построения релятивистских систем отсчета



## Спасибо за внимание!