Тригонометрические уравнения.

Определение тригонометрии

Тригонометрия – математическая дисциплина, изучающая зависимость между сторонами и углами треугольника.



История тригонометрии

Тригонометрия возникла из практических нужд человека. С ее помощью можно определить расстояние до недоступных предметов и, вообще, существенно упрощать процесс геодезической съемки местности для составле
географических карт.

История тригонометрии

Зачатки тригонометрических познаний зародились в древности. На раннем этапе тригонометрия развивалась в тесной связи с астрономией и являлась ее вспомогательным разделом.



Птолемей

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}},\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cdot\cos\beta\pm\sin\beta\cdot\cos\alpha$$

Окончательный вид тригонометрия приобрела в XVIII веке в трудах Л. Эйлера.

Леонард Эйлер

- Дороги не те знания, которые откладываются в мозгу, как жир, дороги те, которые превращаются в умственные мышцы.

Арксинус и его свойства

- ***Арксинусом числа а*** (|**а**|≤1) называется такой угол *α*, принадлежащий отрезку

[-π/2; π/2], синус которого равен **а**.

- Обозначается этот угол arcsin a. Читается так: ***угол, синус которого равен а*** .

Арккосинус и его свойства

- ***Арккосинусом числа а*** (|**а**|≤1) называется такой угол *α*, принадлежащий отрезку [0; π], косинус которого равен **а**.

- Обозначается этот угол arccos a. Читается так: ***угол, косинус которого равен а*** .

Арктангенс и его свойства

- ***Арктангенсом числа а*** называется такой угол *α*, принадлежащий интервалу $(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$ тангенс которого равен **а**.

- Обозначается этот угол arctg a. Читается так: ***угол, тангенс которого равен а*** .

Устный счет

1) $\arcsin\frac{1}{2}$

2) $\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}$

3) $arctg\sqrt{3}$

4) $\arccos 2$

5) $2\arcsin 1$

6) $-3\arccos 0$

7) $\arcsin(-\frac{\sqrt{3}}{2})$

8) $\arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2})$



- Мне приходится делить время между политикой и уравнениями. Однако уравнения, по – моему, гораздо важнее. Политика существует только данного момента, а уравнения будут существовать вечно.

Решение простейших тригонометрических уравнений вида:

$$\sin x = a \text{ , где } |a| \le 1$$



$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in z$$

Частные случаи:

$$\sin x = -1,$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z$$

$$\sin x = 1,$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z$$

$$\sin x = 0,$$

$$x = \pi n, n \in Z$$

Решение простейших тригонометрических уравнений вида:

$\cos x = a$, где $|a| \le 1$



если *0 < a < 1*, то

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in z$$

если *-1 < a < 0*, то

$$x = \pm(\pi - \arccos a) + 2\pi n, n \in Z$$

Частные случаи:

$$\cos x = -1,$$

$$x = \pi + 2\pi n, n \in z$$

$$\cos x = 0,$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in z$$

$$\cos x = 1,$$

$$x = 2\pi n, n \in z$$

Решение простейших тригонометрических уравнений вида:

$$tgx = a$$



$$x = arctga + \pi n, n \in z$$

Устный счет

1) $\sin x = \frac{1}{2}$

2) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3) $tgx = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

4) $\sin 2x = -1$

5) $\cos x = -3$

6) $tgx = 10$

Самостоятельная работа

$$1)\ \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$2)\ ctg\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}$$

$$3)\ tg\,5x = -1$$

$$4)\ \sin\frac{x}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$5)\ 2\cos x - \sqrt{2} = 0$$