

Горбуша

**Савенко Елена
Владимировна
учитель географии,
биологии
МСКОШИ г. Поронайск**


Научная классификация

- **Царство:**
Животные
- **Тип:** **Хордовые**
- **Класс:** **Лучепёрые
рыбы**
- **Отряд:**
Лососеобразные
- **Семейство:**
Лососёвые
- **Род:** **Тихоокеанские
лососи**
- **Вид:** **Горбуша**



Внешний вид

- В океане горбуша имеет светло-синий окрас. По возвращении в нерестилища цвет становится бледно-серый сзади, брюшко приобретает желтовато-белый оттенок (хотя некоторые особи приобретают зелёный оттенок, у самцов развивается чётко различимый горб на спине, из-за которого этот вид лососёвых получил своё название. Средний вес горбуши — 2,2 кг. Самая большая известная горбуша достигала в длину 76 см при весе 6,8 кг.



Среда обитания

- Горбуша водится в холодных водах, предпочитает температуру от 5,6 до 14,6°С при оптимальной температуре в 10,1°С. При температуре в 25,8°С рыба погибает. Горбуша водится в прибрежных водах Тихого и Северного Ледовитого океанов.



Нерест

На нерест горбуша идет в пресные реки. Всё побережье Сахалина, и Курилы - это множество пресных, быстротечных горных речушек, в которые заходит горбуша и откладывает икру.



Возвращение в реки

На нерест горбуша возвращается в то самое место, где сама была произведена на свет малюсенькой икринкой. Из тысяч рек выбирают только одну - свою родную. После нереста, во время которого горбуша теряет в весе, теряет массу сил – рыба погибает.



Размножение

**Нерестится в августе.
Как и другие
лососёвые, перед
откладыванием
икры самка строит
гнездо, роет хвостом
грунт, так что в нем
образуется
углубление. После
оплодотворения
икринки
закапываются.**



Мальки горбуши



Горбуша на Сахалине

Горбуша концентрируется в массовых количествах в районах восточного побережья Сахалина, в заливе Анива. На юго-западном побережье Сахалина наблюдается на ограниченном участке морской береговой линии (Горнозаводск—Чехов). В Сахалинском заливе и в лимане

