

Доклад

Тема: «Редкие животные Алтайского края»



Выполнила: Ускова К.

Проверила:

Катанаева Л.А

2010 год

Горноста́й

(*Mustela erminea*)

Горноста́й — это небольшой хищник тундры и тайги. Распространен зверек от Пиренеев, Альп, Ирландии и далее по

всей Европе, за исключением большей части

Югославии, а также Албании, Греции, Болгарии, Турции.

На территории России встречается практически везде.

В Азии обитает в Афганистане, Монголии, Северо-Восточном

Китае, Северной Японии и, вероятно, на севере Корейского полуострова. Наконец, горноста́й водится в Гренландии и распространен почти до самого юга Северной Америки.



Встречается почти на всей территории бывшего СССР - от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Средней Азии. Обитает чаще всего в долинах рек, близ озёр, тростниковых зарослей, но встречается и в лесах, перелесках, горных россыпях и на полях. Иногда поселяется вблизи жилья. Он встречается даже на полярных островах. Может селиться вблизи лесов, не заходя при этом вглубь чащи. Наибольшей численности горностай достигает в лесостепных районах Западной Сибири и Северного Казахстана.



Горностай, ценный пушной зверёк семейства куньих. Для человека, не имеющего биологического образования, куньи – это роскошный мех, из которого шьют шубы и шапки. Промысловое значение имеют почти все куньи. На этих зверей охотятся, их разводят в специальных хозяйствах, акклиматизируют в природе. Некоторые виды помогают человеку в истреблении мелких грызунов, а некоторые, наоборот, вредят сельскому хозяйству, переносят опасные болезни. Хищник приносит также пользу человеку, истребляя вредных грызунов. Горностаи питаются тем же, чем и хорьки; мелкими птичками, а в особенности рябчиком, тетеревом, глухарём и куропаткой, они наносят большой вред, выпивая их яйца и пожирая молодых птенцов в гнездах.



Шкурка горностая довольно высоко ценится в пушном хозяйстве. Ценный мех стал причиной массового истребления. В ряде мест их поголовье уменьшилось, кое-где эти животные полностью исчезли. Некоторые виды занесены в Красную Книгу. Сейчас активно ведутся работы по охране пушных зверей, принимаются меры по восстановлению их численности.



Горноста́й в общем похож на ласку, но крупнее ее и отличается черным кончиком хвоста. Длина тела колеблется, от 16 до 38 см, хвост от 6 до 12 см, масса до 260 г, но обычно меньше. Как и ласка, на зиму горноста́й белеет и лишь кончик хвоста остается черным. . Он предпочитает перелески, захламленные опушки лесов, кустарники, зарастающие вырубки, поймы рек, поля и т. д. Здесь он ловит всевозможных грызунов вплоть до водяных полевок и хомяков. Часто разоряет гнезда птиц; при недостатке грызунов ест лягушек, рыбу, а в голодные годы — даже ягоды можжевельника и отбросы. При изобилии пищи из остатков добычи устраивает запасы. Подобно ласке, горноста́й охотится не только на поверхности земли, но и в ходах более крупных грызунов и, уничтожив хозяев, часто селится в их гнездах. Он отлично плавает и ловко забирается на деревья и кусты. По снегу он бежит ровными прыжками, то и дело ныряя под кучи хвороста и корни, а иногда движется в толще снежного покрова. Размножается он один раз в году.

Название	Горноста́й (<i>Mustella erminea</i>)
Семейство	Куньи
Отряд	Хищные
Класс	Млекопитающие
Отличительные признаки	Длинный силуэт, короткие лапы, двуцветность: рыжевато-бурая окраска верхней и белая окраска нижней части тела; на хвосте кисточка чёрного цвета.
Размер	Длина тела, включая голову 187-325 мм самцы, и 170-270 мм самки, длина хвоста 95-130 мм.
Вес	Самец – 200-450г; самки 110-280г.
Распространение	Практически все зоны с умеренным и холодным климатом в Северном полушарии.
Места обитания	От лесов до тундры.
Питание	Хищник питается мелкими травоядными, птицами.
Число детёнышей	От 5 до 8 детёнышей
Вес при рождении	1-4 г
Продолжительн. жизни	6-8 лет (среднее 1 год)
Численность	Колебание до полного исчезновения с последующим заселением заново.

Горноста́й зимой



Добыча горностая







