

**ЛЕКЦИЯ №5**

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ГРУППЫ  
ГИДРОБИОНТОВ**

# План лекции

1. Характеристика и классификация планктона.
2. Плавучесть и приспособления к активному движению нектона.
3. Общая характеристика бентоса и перифитона.  
Экологические группировки донных организмов и их адаптация к донному образу жизни.
4. Организмы обрастаний, перифитон. Понятие экологической пластичности.

# Жизненные формы гидробионтов

*Жизненные формы* – совокупность организмов разного систематического положения, обладающие сходными приспособлениями, позволяющими им существовать и удерживаться в определенных биотопах.

## *Биотопы водоема:*

- *пелагиаль* – толща воды;
- *бенталь* – дно с прилегающим слоем воды;
- *нейсталь* – поверхностный слой воды, граничащий с атмосферой.

# Организмы, населяющие внутренние воды

По отношению к фактору минерализации выделяют :

эвригалинные или стеногалинные,  
галофильные или галофобные  
и другие экологические формы  
организмов.

Как правило, организмы, населяющие внутренние воды, подразделяют на четыре группы:

- 1) *пресноводные виды*, обитающие при минерализации менее 3 г/л, среда их обитания – пресные, или олигогалинные (до 0.5 г/л) и солоноватые, или субгалинные (0.5–3 г/л) воды;
- 2) *пресноводные солевыносливые виды*, которые обитают при минерализации до 15 (20) г/л (гипогалинные воды);
- 3) *галофильные виды*, встречающиеся главным образом в соленой воде до 50 г/л (мезогалинные воды), но иногда и в пресных водах;
- 4) *галобионтные виды*, ограниченные соленостью 50–300 г/л (гипрегалинные воды).

## Виды перемещения

- *Плавучесть* – развитие различных адаптаций, замедляющих погружение организмов (жировые включения, образование выростов, редукция скелетных образований и т.д.);
- *пассивное движение* – использование течения;
- *активное движение* – плавание, реже прыгание и скольжение, полет и т.д.;
- *миграции* (вертикальные и горизонтальные: анадромные и катадромные).

# Планктон

**Планктон** (от греч. planktos – парящий, блуждающий) – это совокупность пелагических организмов, не обладающих способностью к быстрым и активным передвижениям, пассивно переносимых течением.

Планктонные организмы не могут противостоять течениям.

К планктону относятся преимущественно микроскопические водоросли – фитопланктон, мелкие животные – зоопланктон и бактериопланктон. В состав планктона периодически включаются и парящие в толще воды личинки многих животных.

Фитопланктон населяет слои воды с достаточной освещенностью, зоопланктон и бактериопланктон – всю толщу воды

# Планктон

Составляют организмы слишком мелкие, не способные противостоять силам движения воды и контролировать свое положение в воде. Они парят в толще воды и переносятся ею.

**Растительные организмы** планктона составляют **фитопланктон** – это одноклеточные (хотя могут быть и колониальные) микроскопические водоросли (сине-зеленые водоросли, диатомовые водоросли, панцирные жгутиконосцы).

**Животные**, представленные в планктоне, – **зоопланктон**. В эту группу входит множество простейших, коловраток, мелких рачков (например, дафнии и циклопы). Кроме того, в зоопланктон включаются личинки насекомых, рыб, многих организмов бентоса, слишком мелкие и слабые для самостоятельного передвижения в толще воды.

**В планктоне** присутствует и множество бактерий, составляющих **бактериопланктон**.

**Обитатели талой воды**, встречающиеся в трещинах льда или снега – **криптопланктон**.

*По размерам планктонные организмы делятся на:*


- мегалопланктон – более 5 см,
- макропланктон – 5 мм,
- мезопланктон – 0,5 мм,
- икропланктон – 50 мкм,
- наннопланктон – 5 мкм,
- пикопланктон – менее 5 мкм

**Мезозопланктон:**, веслоногие рачки (копеподы). **Макрозоопланктон:** высшие ракообразные.

**Меропланктон:** икра и личинки рыб.

# Фитопланктон

– СОВОКУПНОСТЬ  
СВОБОДНОЖИВУЩИХ В  
ТОЛЩЕ ВОДЫ МЕЛКИХ,  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ  
ВОДОРОСЛЕЙ.





# Зоопланктон:

- Бактерии.
- Простейшие:  
зоофлагелляты  
(гетеротрофные  
жгутиковые), инфузории  
(Ciliata), саркодовые  
(амебы *Diffugia*).
- Коловратки (Rotatoria).
- Низшие ракообразные  
(Crustacea).




Амебы *Diffugia*



Rotatoria



Ветвистоусый рачок  
*Daphnia* sp.



Инфузории

# Нектон

***Нектон*** (от греч. nektos – плавающий) – это совокупность пелагических активно передвигающихся животных, не имеющих непосредственной связи с дном, способных противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на значительные расстояния. В основном это крупные животные, способные преодолевать большие расстояния и сильные водные течения. Для них характерна обтекаемая форма тела и хорошо развитые органы движения. Типичными **нектонными организмами являются рыбы, кальмары, ластоногие, киты. В пресных водах, кроме рыб, к нектону относятся земноводные и активно перемещающиеся насекомые.**

Многие морские рыбы могут передвигаться в толще воды с огромной скоростью. Очень быстро, до 45–50 км/ч, плавают некоторые кальмары, парусники развивают скорость до 100–110 км/ч, а меч-рыба – до 130 км/ч.

# Нектон

Активные пловцы (рыбы, амфибии, рептилии, звери, крупные насекомые и их личинки в пресных водах, головоногие моллюски в морских водах), способные противостоять течениям и сопротивлению воды, составляют нектон (нектос (греч.) – плавающий)



# Приспособления для планктонного и нектонного образов жизни

- *Плавучесть* – развитие различных адаптаций, замедляющих погружение организмов (жировые и газовые включения, образование выростов, редукция скелетных образований и т.д.);
- *пассивное движение* – использование течения;
- *активное движение* – плавание, реж, прыгание и скольжение, полет и т.д.;
- *миграции* (вертикальные и горизонтальные: анадромные и катадромные).



Полет



Плавание реактивным способом


# Плейстон

Организмы, которые пассивно плавают на поверхности воды или ведут полупогруженный образ жизни получили название **плейстон** (от греч. pleusis - плавание). Часто они используют как опору пленку поверхностного натяжения или образуют воздушные полости и другие поплавки. Типичными плейстонными животными являются сифонофоры, некоторые моллюски и др. Из растительных организмов к плейстону относятся саргассовые водоросли, ряски.

# Плейстон

– это организмы крупных или средних размеров, часть тела которых находится в воде, а другая выступает над ней (сифонофоры, некоторые рыбы).

Наибольшее богатство фитоплейстона достигается в небольших стоячих водоемах – в прудах, старицах и небольших озерах. Зооплейстон практически встречается только в морях и океанах – сифонофоры и брюхоногие моллюски.



*Verella*



Сифонофора *Physalia*

# Нейстон

Представляет собой своеобразную разновидность планктона. **Нейстон** (от греч. neustos – плавающий) – сообщество организмов, обитающих у поверхностной пленки воды.

Организмы, обитающие сверху поверхностной пленки – *эпинейстон*, снизу – *гипонейстон*. К нейстону относят также обитателей верхнего пятисантиметрового слоя воды. Нейстон составляют некоторые простейшие, одноклеточные водоросли, мелкие легочные моллюски, водомерки, вертячки, личинки комаров и др.

# Нейстон

Биотоп граница *воздух/вода* населен своеобразными организмами, составляющими целое сообщество, удерживающееся в поверхностной пленке воды, за счет силы поверхностного натяжения. Это – *нейстон* (пленка). В нем выделяют *эпинейстон* (организмы, живущие над пленкой – клопы-водомерки, жуки-вертячки) и *гипонейстон* (... под пленкой – бактерии, простейшие, ракообразные, моллюски, насекомые, молодь рыб).





# Нейстон

Выделяют также:

*эвгипонейстон* — в течение всей жизни связаны с поверхностным слоем воды (сагитты, веслоногие рачки Pontellidae);

*мерогипонейстон* — лишь на отдельных стадиях развития (личинки моллюсков, яйца полихет, икра кефали, ставриды, хамса, личинки многих рыб).



# Бентос

**Бентос** (benthos – глубина) – совокупность организмов, обитающих на дне (на грунте и в грунте) водоемов.

Бентос подразделяется на *фитобентос* и *зообентос*. В основном представлен прикрепленными или медленно передвигающимися, а также роющимися в грунте животными. Только на мелководье он состоит из организмов, синтезирующих органическое вещество (продуценты), потребляющих (консументы) и разрушающих (редуценты) его. На больших глубинах, куда не проникает свет, фитобентос (продуценты) отсутствует.

Бентосные организмы различаются:

по образу жизни – подвижные (бродячие), мало подвижные (лежачие) и неподвижные (прикрепленные);

по способу питания – фотосинтезирующие, растительноядные, плотоядные, детритоядные;

по размерам – макро-, мезо-, микробентос.

# Бентос

Обитатели биотопа вода/дно составляют бентос (бентос (греч.) – глубина) – организмы, обитающие на поверхности грунта и в его толще. По размерам они делятся на: микро- – мельче 0,1 мм; мейо (мезо)- – 0,1-2 мм; макробентос – более 2 мм.

**Бентосные организмы** – это бактерии, водоросли, грибы, простейшие (инфузории и корненожки), губки, кораллы, кольчатые черви, ракообразные, личинки насекомых, моллюски, черави, иглокожие.

**Животные – обитатели дна** именуется **зообентосом** и отличаются большим разнообразием, чем планктонты. **Растительное население дна – фитобентос** представлено высшими водными растениями и водорослями. Перифитон (пери- (греч.) – вокруг, фитон (греч.) – растение) – водоросли, обрастающие плотные субстраты;

**Макрофиты – высшие водные растения.**

Классификация экологических групп фитобентоса: гидрофиты – настоящие водные растения, полностью или большей своей частью погруженные в воду; гидатофиты – погруженные в воду (элодея канадская, сальвиния, рдест, роголистник ит.д.); плейстофиты – плавающие на поверхности (кувшинки, кубышки, ряска, многокоренник, сальвиния, телорез и т.д.);

гелофиты – водно-болотные растения – надводные растения с поднимающимися над поверхностью воды стеблями и листьями, укореняющиеся (хвощ, рогоз, тростник обыкновенный, камыш, стрелолист и т.д.); гигрофиты – обитатели суши, но растущие в условиях избыточного увлажнения почвы (осока, хвощи др.).

К **нектобентосу** относятся формы, плавающие в толще воды, и лишь периодически опускающиеся на дно. К наиболее массовым представителям бентоса относятся **бактерии, актиномицеты, водоросли, грибы, простейшие (особенно корненожки и инфузории), губки, кораллы, кольчатые черви, ракообразные, личинки насекомых, моллюски, иглокожие.** В состав

# Бентос

– организмы, обитающие на поверхности грунта и в его толще, в соответствии с чем его подразделяют на *эпи-* и *эндобентос*.

По размерам они делятся на:

- *Микро* – мельче 0.1 мм;
- *Мейо (мезо)* – 0.1-2 мм;
- *Макробентос* – более 2 мм.




Это бактерии, водоросли, грибы, простейшие (инфузории и корненожки), губки, кораллы, кольчатые черви, ракообразные, личинки насекомых, моллюски, иглокожие.

# Фитобентос

— растения, частично или полностью прикрепленные ко дну водоема, до нижних границ трофогенного (фотического) слоя.

## Классификация экологических групп фитобентоса:

1. **Гидрофиты** — настоящие водные растения, полностью или большей своей частью погруженные в воду.



много-  
коренник



элодея  
канадская

• **Гидатофиты** — погруженные в воду (элодея канадская, сальвиния, рдест, роголистник и т.д.).

• **Плейстофиты** — плавающие на поверхности (кувшинки, кубышки, ряска, многокоренник, сальвиния, телорез и т.д.).



тростник

2. **Гелофиты** — водно-болотные растения — надводные растения с поднимающимися над поверхностью воды стеблями и листьями, укореняющиеся (хвощ, рогоз, тростник обыкновенный, камыш, стрелолист и т.д.).



хвощ



кубышки

3. **Гигрофиты** — обитатели суши, но растущие в условиях избыточного увлажнения почвы (осока, хвоци д.р.).

# Зообентос

Животные – обитатели дна отличаются большим разнообразием, чем планктонты.

Питаются сестоном (органические частицы в толще воды) – потребляют органику, осевшую на дно, от мельчайших частиц до опавших листьев).


Зоофаги бентоса, как и планктона, питаются другими животными.



поденка



коралл



иглокожи

е



нематода



актини

и



веснянка

# Пелагобентос

– это организмы, обитающие в зоне контакта толщи воды с дном, которые то плавающие, то передвигающиеся по грунту или закапывающиеся в него.

В зависимости от размеров выделяют:

- нектобентос (раки, креветки, мизиды, скаты, камбала);
- планктобентос (личинки комара *Chaoborus*, многие жуки, веслоногие и ветвистоусые рачки ...).



Попеременное обитание в толще воды и в грунте ведет к выработке у представителей этой жизненной формы специфических адаптаций, которые позволяют проникать в грунт и оставаться в контакте с ним, с другой стороны – возможность находиться во взвешенном состоянии.

# Перифитон

Своеобразной группой водных организмов является ***перифитон*** (от греч. peri – около и phyton – растение).

Это совокупность организмов, которые поселяются на подводных предметах или растениях и образуют так называемые обрастания на природных или искусственных твердых поверхностях – камнях, скалах, подводных частях судов, сваях, гидротехнических сооружениях (водоросли, усоногие раки, моллюски, мшанки, губки и др.).

**Организмы перифитона – это обрастатели.**



# Перифитон

Организмы, обитающие на плотных субстратах за пределами придонного слоя воды.

*Перифитонные организмы* обитают на покрытых водой поверхностях различных гидротехнических сооружений, днищах кораблей и на других объектах, на корягах, растениях, животных и т.д. Это бактерии, актиномицеты, многие водоросли, грибы, простейшие, губки, мшанки, черви, низшие ракообразные (усоногие), двустворчатые моллюск и другие беспозвоночные.



Усоногие рачки



Мшанки



Моллюски



# **Пластичность водных организмов**

**Морфологическая пластичность** водных организмов различная. Они обладают меньшей экологической пластичностью, чем наземные, так как вода – более стабильная среда и абиотические факторы ее претерпевают сравнительно незначительные колебания. Наименее пластичны морские растения и животные. Они очень чувствительны к изменениям солености воды и ее температуры. Пресноводные животные и растения, как правило, гораздо пластичнее, чем морские, поскольку пресная вода как среда жизни более изменчива. Самыми же пластичными являются солоноватоводные обитатели. Они адаптированы и к высокой концентрации растворенных солей и к значительному опреснению. Однако насчитывается сравнительно небольшое количество их видов, поскольку в солоноватых водах экологические факторы претерпевают существенные изменения.

**Экологическая пластичность** служит важным регулятором расселения организмов. Как правило, гидробионты с высокой экологической пластичностью распространены довольно широко.

# Экологическая пластичность

— степень выносливости организмов или их сообществ (биоценозов) к воздействию факторов среды.

Экологически пластичные виды имеют широкую норму реакции, т. е. широко приспособлены к разной среде обитания (рыбы колюшка и угорь, некоторые простейшие живут как в пресных, так и в соленых водах).

Узкоспециализированные виды могут существовать лишь в определенной среде; морские животные и водоросли в соленой воде, речные рыбы и растения лотос, кувшинка, ряска обитают только в пресной воде.

# Абиотические факторы водной среды.

- ◆ Колебания температур в Мировом океане – от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+36^{\circ}\text{C}$ . В пресных водоёмах – от  $-0,9^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ .  
Исключения – термальные источники до  $+95^{\circ}\text{C}$

Такие термодинамические особенности водной среды, как высокая удельная теплоёмкость, большая теплопроводность и расширение при замерзании создают особо благоприятные условия для жизни.

Поскольку температурный режим водоёмов характеризуется большой стабильностью, организмы, обитающие в них, отличаются относительным постоянством температуры тела и обладают узким диапазоном приспособленности к колебаниям температуры среды.



- ◆ Плотность и вязкость водной среды – в 800 раз превосходит воздушную. На растениях эти особенности сказываются в том, что у них слабо развита механическая ткань, поэтому им присуща плавучесть и способность находиться в воде во взвешенном состоянии. У животных – обтекаемая форма тела, покрыто слизью.



- ◆ Световой режим и прозрачность воды. Зависит от сезона, обуславливается также закономерным убыванием света с глубиной, из-за того, что вода поглощает свет, при этом лучи с разной длиной волны поглощаются неодинаково, быстрее всего красные, а сине-зелёные проникают значительно глубже.

- ◆ Солёность воды. Это прекрасный растворитель многих минеральных соединений.
- ◆ Содержание кислорода – обратно пропорционально температуре. С понижением температуры растворимость кислорода и других газов увеличивается.





- ◆ Концентрация водородных ионов.  
Пресноводные бассейны :  
рН 3,7-4,7 – считаются кислыми;  
6,95 – 7,3 – нейтральными;  
больше 7,8 – щелочными.

Морская вода более щелочная, рН меньше изменяется, с глубиной уменьшается.

# Приспособление гидробионтов к бентосному и перифитонному образу жизни

- **удержание на твердом субстрате** достигается повышением плотности, прикреплением к субстрату, заглублением в него, развитием различных якорей и некоторыми другими способами;
- **защита от засыпания взвесью** характерна для прикрепленных к грунту организмам, которым грозит опасность захоронения под слоем осадков вследствие непрерывного оседания на дно взвешенных в воде минеральных и других частиц – приподнятие над грунтом тела, прикрепление с помощью длинного вертикального стебелька (морская лилия); наличие столбообразной подставки (губка *Coeloptychium*); поселение на субстрате, возвышающемся над дном и т.д.;
- **движение:** по степени подвижности выделяют формы бродячие, или *вагильные* (крабы, осьминоги, морские звезды), *седентарные*, которые лежат на грунте, не делая значительных перемещений (моллюски, морские ежи), и прикрепленные, или *сессильные* (губки, мшанки, кораллы);
- **миграции.**

