



**КЛИНИКА ОАО "МЕДИЦИНА"**

*Все лучшее в медицине!*

# Оказание первой ПОМОЩИ

Октябрь 2011



THE SWISS  
LEADING  
HOSPITALS  
Best in class.

EFQM  
Recognised for excellence  
5 star





## УК РФ Федеральный закон

от 13 июня 1996 года №63-ФЗ

### Глава 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

#### **Статья 39. Крайняя необходимость**

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.



## Кома

Внешне кома напоминает глубокий сон, но разбудить такого спящего не удастся. Он не реагирует на сильные звуковые и болевые раздражители.

Для человека в состоянии комы положение лежа на спине крайне опасно! (пострадавший может погибнуть уже через 1-2 минуты)

Ни в коем случае не следует терять время ни на вызов скорой помощи, ни на выяснение обстоятельств случившегося.



## **Нарушение сознания**

Нарушение сознания - один из признаков, характеризующих церебральную недостаточность.

Клинически проявляется потерей сознания, нарушением двигательных, чувствительных и соматических функций.

Причинами нарушения сознания могут быть метаболические причины (сахарный диабет), отравления (алкогольное опьянение, наркотики), поражения головного мозга как травматического, так и сосудистого генеза (инсульты, обмороки), гипоксические состояния.



# КЛИНИКА ОАО «МЕДИЦИНА»



*Все лучшее в медицине!*

## Экстренная помощь пострадавшему в состоянии комы



Определить наличие пульса на сонной артерии. (приложить 4 пальца под угол нижней челюсти, у верхнего края кивательной мышцы)

## Западение языка





# КЛИНИКА ОАО "МЕДИЦИНА"

*Все лучшее в медицине!*

При наличии пульса на сонной артерии повернуть пострадавшего на живот






## Клиническая смерть

Клиническая смерть- это ранний, но обратимый этап умирания и нацеливает очевидца на незамедлительное проведение реанимационных действий. (RE- возвращение, ANIMA- душа).

Продолжительность клинической смерти составляет 4-5 минут после остановки сердца

Признак клинической смерти:  
отсутствие сознания, отсутствие пульса на сонных артерия, и отсутствие признаков биологической смерти







# КЛИНИКА ОАО "МЕДИЦИНА"

*Все лучшее в медицине!*


## Реанимация

Прежде чем приступить к реанимации необходимо уложить пострадавшего на жесткую, ровную поверхность, освободить грудную клетку от одежды.




## Непрямой массаж сердца

1. Расположить основание правой ладони выше мечевидного отростка, левую ладонь расположить на ладони правой руки.
2. Непрямой массаж сердца проводится прямыми руками.
3. Продавливать грудную клетку на глубину 5 см, и с частотой не менее 100 в минуту





## Непрямой массаж сердца



4. Каждое следующее надавливание следует начинать только после того, как грудная клетка вернется в исходное положение

5. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции легких – 30:2, независимо от участников реанимации.

После выполнения 30 компрессий грудной клетки делаем 2 искусственных вдоха



## Искусственная вентиляция легких

1. Правой рукой обхватить подбородок, так чтобы пальцы расположенные на нижней челюсти и щеках пострадавшего смогли разжать и раздвинуть его губы.
- 2.левой рукой зажать нос
3. запрокинуть голову пострадавшего и удерживать в таком положении до окончания проведения вдоха
4. Плотнo прижаться губами к губам и сделать искусственный вдох.

