

# Урок-конференция

Радиация и ее воздействия на биологические  
объекты

Учитель Прокопец Н.Д.

# Естественный радиационный фон

---

- Внешнее облучение:
  - *космическое излучение*
  - *земная радиация*
- Внутреннее облучение

# Искусственные источники радиации

---

- Источники радиации, используемые в медицине
- Ядерные взрывы
- Атомная энергетика
- Чернобыльская трагедия


# Воздействие радиации на биологические объекты

---

- Воздействие ионизирующего излучения на ткани организма
- Проникающая способность излучения и способы защиты
- Дозы облучения )

# Уровни космического облучения

100 км



20 000 м  
13 мкЗв/ч



10 км

12 000 м  
5 мкЗв/ч



4 000 м  
0,2 мкЗв/ч

2 000 м  
0,1 мкЗв/ч

1 км



Уровень моря

0,03 мкЗв/ч

# Доза, получаемая при трансатлантическом перелете




# Радиоактивные элементы, дожившие до наших дней

---

- Th-232 период полураспада 14 млрд лет
- U-238 период полураспада 4,5 млрд лет
- U-235 период полураспада 0,7 млрд лет
- И продукты их распада: радиоактивный калий, рубидий, радий, радон, полоний, висмут, свинец и т. д.

# Внутреннее облучение





# Ядерный взрыв

---



# Радиоактивные осадки содержат

---


- Углерод-14  
с периодом полураспада 5730 лет
- Цезий-137  
с периодом полураспада 30 лет
- Цирконий- 95  
с периодом полураспада 64 суток
- Стронций-90  
с периодом полураспада 30 лет

# Чернобыльская трагедия

---

- В атмосферу выброшено 7 т ядерного горючего
- Чернобыльская катастрофа приравнивается к взрыву 200-300 бомб, сброшенных на Хиросиму
- Ближайшие 100 лет все дожди будут радиоактивны

# Схема воздействия рентгеновского и радиоактивного излучения на ткани организма



# Дозы облучения

---

- До 5 мЗв в год – безопасная доза
- разовая 100 мЗв – допустимая доза
- разовая 750 мЗв – лучевая болезнь
- разовая 4,5 Зв –тяжелая степень лучевой болезни ( гибель 50 % )

# Проникающая способность излучения


Вид излучения	Длина свобод. пробега (воздух) (био. ткани)		Опасное воздействие
Альфа-лучи	до нескольких см	до 0,1 мм	радиоактивное заражение кожи
Бета-лучи	до нескольких метров	до нескольких см	воздействие на глаза, легкие
Гамма-лучи	около 100 метров	10-15 см	ионизация вещества

# Способы защиты от радиации

---

- Удаление от источника излучения
- Использование преграды из поглощающих излучение материалов (лист бумаги толщиной 0,1 мм полностью поглощает альфа-лучи, а от бета-лучей защитит лист алюминия толщиной 5 мм )

# Дозы облучения







## Опасные уровни радиации.

уровни радиации, при которых погибает 50% облученных в течение 30 дней

рентген

1000-150000	Растения	
100000	Амебы	
20000	Улитки	
8000-20000	Змеи	
1000-10000	Насекомые	
800-2000	Рыбы, птицы	
600-1500	Крысы, мыши	
300-600	Обезьяны, человек	
200-400	Собаки, овцы, козы	

*Опасные уровни радиации*



■ Спасибо за урок!