



СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Дисперсионный анализ

Лебедева Антонина, Евстратова Екатерина, Дуркина Галина

Назначение метода

- Дисперсионный анализ – анализ изменчивости признака под влиянием каких-либо контролируемых переменных факторов.
- Методами дисперсионного анализа устанавливается наличие влияния заданного фактора на изучаемый процесс (на выходную переменную процесса) за счёт статистической обработки наблюдаемой совокупности выборочных данных.

Назначение метода

- Дисперсионный анализ есть совокупность статистических методов, предназначенных для проверки гипотез о связи между определенными признаками и исследуемыми факторами, которые не имеют количественного описания, а также для установления степени влияния факторов и их взаимодействия. В специальной литературе его часто называют ANOVA (от англоязычного названия Analysis of Variations). Впервые этот метод был разработан Р. Фишером в 1925 г.



Типы решаемых задач

- Основной целью дисперсионного анализа является исследование значимости различия между средними. Установить различаются ли три группы или более по какому-либо одному количественному признаку
- Обобщенно задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности признака выделить три частные вариативности:
 - Вариативность, обусловленную действием каждой из исследуемых независимых переменных.
 - Вариативность, обусловленную взаимодействием исследуемых независимых переменных.
 - Вариативность случайную, обусловленную всеми неучтенными обстоятельствами.

Цель и задачи

- **Цель:** выявить дифференциацию представлений о нормативном сексуальном поведении среди представителей различных поколений в современной России и определяющие её факторы.
- **Задачи:**
 1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к проблеме сексуальной нормы в научной литературе.
 2. Обобщить результаты эмпирических исследований о дифференциации представлений о сексуальной норме среди населения современной России.
 3. Определить факторы, обуславливающие различия в представлениях о сексуальной норме среди населения России в целом
 4. Выявить специфику межпоколенных различий в представлениях о сексуальной норме в Архангельской области по сравнению с общероссийской ситуацией



Возможности применения методов в социологических исследованиях

- Применительно к социологическим данным таковыми являются частоты различных вариантов ответов респондентов на вопросы анкет массовых опросов, измеряемые в процентах от общего числа ответов и интерпретируемые как вероятности отношения изучаемых групп населения к исследуемым социальным явлениям или процессам.

- Построение дисперсионного комплекса.
- Вычисление средних квадратов отклонений.
- Вычисление дисперсии
- Сравнение факторной и остаточной дисперсий
- Оценка результатов с помощью теоретических значений распределения Фишера-Снедекор



Методы (методики, разновидности) данного вида анализа

- Исходным материалом для дисперсионного анализа служат данные исследования трех и более выборок, которые могут быть как **равными**, так и **неравными** по численности, как **связными**, так и **несвязными**. По количеству выявляемых регулируемых факторов дисперсионный анализ может быть **однофакторным** (при этом изучается влияние одного фактора на результаты эксперимента), **двухфакторным** (при изучении влияния двух факторов) и **многофакторным** (позволяет оценить не только влияние каждого из факторов в отдельности, но и их взаимодействие).



Суть метода, формулы

- Однофакторный дисперсионный анализ основан на том, что сумму квадратов отклонений статистического комплекса возможно разделить на компоненты:
- $SS = SSa + SSe$,

Где:

SS - общая сумма квадратов отклонений,

SSa - объяснённая влиянием фактора a сумма квадратов отклонений,

SSe - необъяснённая сумма квадратов отклонений или сумма квадратов отклонений ошибки.

- Если через n_i обозначить число вариантов в каждом классе градации (группе) и a - общее число градаций фактора (групп), то $\sum_{i=1}^a n_i = n$ - общее число наблюдений и можно получить следующие формулы:

- общее число квадратов отклонений: $SS = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2$

- объяснённая влиянием фактора a сумма квадратов отклонений: $SS_2 = \sum_{i=1}^a n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$

- необъяснённая сумма квадратов отклонений или сумма квадратов отклонений ошибки: $SS_e = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$

Где

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$ - общее среднее наблюдений,

$\bar{X}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$ - среднее наблюдений в каждой градации фактора (группе).

- Кроме того,

$$\begin{aligned}SS_{\varepsilon} &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2 = \sum_{i=1}^a (n_i - 1) s_i^2 = \\ &= (n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2 + \dots + (n_a - 1) s_a^2,\end{aligned}$$

где s_i^2 - дисперсия градации фактора (группы).

- Чтобы провести однофакторный дисперсионный анализ данных статистического комплекса, нужно найти фактическое отношение Фишера - отношение дисперсии, объяснённой влиянием фактора (межгрупповой), и необъяснённой дисперсии (внутригрупповой): $F = \frac{MS_a}{MS_e}$
- и сравнить его с критическим значением Фишера: F_{α, ν_a, ν_e}

- Дисперсии рассчитываются следующим образом:

$MS_a = \frac{SS_a}{a-1}$ объяснённая дисперсия,

$MS_e = \frac{SS_e}{n-a}$ необъяснённая дисперсия,


при этом

$va = a - 1$ - число степеней свободы объяснённой дисперсии,

$ve = n - a$ - число степеней свободы необъяснённой дисперсии,

$v = n - 1$ - общее число степеней свободы.

- Критическое значение отношения Фишера с определёнными значениями уровня значимости и степеней свободы можно найти в статистических таблицах или рассчитать с помощью функции MS Excel F.ОБР



Аргументы функции

F.ОБР

Вероятность = ЧИСЛО

Степени_свободы1 = ЧИСЛО

Степени_свободы2 = ЧИСЛО

=

Возвращает обратное значение для (левостороннего) F-распределения вероятностей: если $p = F.РАСП(x, \dots)$, то $F.ОБР(p, \dots) = x$.

Вероятность вероятность, связанная с F-интегральным распределением, число в диапазоне от 0 до 1 включительно.

Значение:

[Справка по этой функции](#)

OK Отмена

Двухфакторный анализ

- Двухфакторный дисперсионный анализ применяется для того, чтобы проверить возможную зависимость результативного признака от двух факторов - А и В. Тогда а - число градаций фактора А и b - число градаций фактора В. В статистическом комплексе сумма квадратов остатков разделяется на три компоненты:
- $SS = SSa + SSb + SSe,$

$$SS = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{X}_{ij} - \bar{\bar{X}})^2$$

-общая сумма квадратов отклонений,

$$SS_a = b \sum_{i=1}^a (\bar{X}_i - \bar{X})^2$$

-объяснённая влиянием фактора А сумма квадратов отклонений,
 -объяснённая влиянием фактора В сумма квадратов отклонений,

$$SS_b = a \sum_{j=1}^b (\bar{X}_j - \bar{X})^2$$

$$SS_e = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (X_{ij} - \bar{X}_i - \bar{X}_j + \bar{X})^2$$

- необъяснённая сумма квадратов отклонений или сумма квадратов отклонений ошибки,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b X_{ij}$$

- общее среднее наблюдений,

$$\bar{X}_i = \frac{1}{b} \sum_{j=1}^b X_{ij}$$

- среднее наблюдений в каждой градации фактора А,

$$\bar{X}_j = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a X_{ij}$$

- среднее число наблюдений в каждой градации фактора В.

- Дисперсии вычисляются следующим образом:

$MS_A = \frac{SS_A}{a-1}$ - дисперсия, объяснённая влиянием фактора А,

$MS_B = \frac{SS_B}{b-1}$ - дисперсия, объяснённая влиянием фактора В,

$MS_e = \frac{SS_e}{(a-1)(b-1)}$ - необъяснённая дисперсия или дисперсия ошибки,

Где:

- $v_a = a - 1$ - число степеней свободы дисперсии, объяснённой влиянием фактора А,
- $v_b = b - 1$ - число степеней свободы дисперсии, объяснённой влиянием фактора В,
- $v_e = (a - 1)(b - 1)$ - число степеней свободы необъяснённой дисперсии или дисперсии ошибки,
- $v = ab - 1$ - общее число степеней свободы.
- Если факторы не зависят друг от друга, то для определения существенности факторов выдвигаются две нулевые гипотезы и соответствующие альтернативные гипотезы:

для фактора А:

$H_0: \mu_{1A} = \mu_{2A} = \dots = \mu_{aA},$

$H_1: \text{не все } \mu_{iA} \text{ равны};$

для фактора В:

$H_0: \mu_{1B} = \mu_{2B} = \dots = \mu_{aB},$

$H_1: \text{не все } \mu_{iB} \text{ равны}.$

- Если фактическое отношение Фишера больше критического отношения Фишера, то следует отклонить нулевую гипотезу с уровнем значимости α . Это означает, что фактор существенно влияет на данные: данные зависят от фактора с вероятностью $P = 1 - \alpha$.
- Если фактическое отношение Фишера меньше критического отношения Фишера, то следует принять нулевую гипотезу с уровнем значимости α . Это означает, что фактор не оказывает существенного влияния на данные с вероятностью $P = 1 - \alpha$.



СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Спасибо за внимание!