

*Правительство Свердловской области
Министерство здравоохранения Свердловской области
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж»*

ВИЧ и СПИД

*Выполнила студентка 293 группы
Специальность «Сестринское дело»
Устьянцева Юлия Вячеславовна
Руководитель: Кирюхина Е.А.*

*г. Нижний Тагил
2020*



Полагаете, что ВИЧ и СПИД имеют единое определение и ничем не отличаются?

Вы глубоко заблуждаетесь!

Есть огромная разница между этими заболеваниями порой исчисляется 12-15 годами жизни.


СПИД ≠ заболевание

**ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ =
заболевание
заканчивающиеся
СПИДОМ!!!**


СПИД ≠ заболевание
заканчивающиеся
СПИДОМ!!!

В чем разница ВИЧ и СПИДа?

ВИЧ:

- 
- *вирус, вызывающий СПИД;*
 - *важно поддерживать иммунную систему и подавлять развитие вируса;*
 - *можно жить десятилетиями, оставаясь носителем вируса*

СПИД

- 
- *последняя стадия ВИЧ-инфекции;*
 - *требуется лечение от всех сопутствующих болезней;*
 - *быстро приводит к летальному исходу.*

Внимание!
ВИЧ – «медленный» вирус, поскольку его первые симптомы могут проявиться через несколько лет после инфицирования. Около 50% зараженных людей не подозревают о наличии инфекции около 10 лет.

Что такое ВИЧ инфекция?

- **ВИЧ** – вирус иммунодефицита человека, ослабляющий иммунную систему и провоцирующий развитие оппортунистических заболеваний. Попадая в организм, ВИЧ встраивается в клетки-мишени – Т-лимфоциты и CD₄.



Симптомы ВИЧ



Первые симптомы (схожи с признаками гриппа и ОРВИ):

- увеличенные лимфатические узлы,
- снижение работоспособности,
- аллергические реакции,
- шелушение кожи,
- быстрая утомляемость,
- потеря аппетита,
- высокая температура.

Симптомы, свидетельствующие об иммунодефиците на последующих стадиях:

- частая лихорадка,
- неврологические расстройства,
- хронические заболевания,
- ухудшение функции памяти,
- резкое похудение,
- вирусные заболевания,
- грибковые и бактериальные инфекции.

ВИЧ передается:



через сексуальный контакт без презерватива при всех видах секса (вагинальном, анальном, оральном)



при внутривенном употреблении наркотиков



от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью



в лечебных учреждениях при нарушении норм дезинфекции, стерилизации, заготовки крови и искусственном оплодотворении



при использовании нестерильного инструмента для татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра



при использовании чужих бритвенных принадлежностей и зубных щеток

ВИЧ не передается:



при объятиях и дружеских поцелуях



при кашле и чихании



при укусах насекомых и животных



через деньги



во время принятия пищи и при пользовании общей посудой



в общественных местах и транспорте при коллективных занятиях спортом



при пользовании общим туалетом, душем, бассейном



через постельное белье или другие личные вещи



- **СПИД** – синдром приобретенного иммунодефицита, проявляющийся в виде одного или нескольких оппортунистических заболеваний. Являясь тяжелой формой ВИЧ, она может привести к полному разрушению иммунной системы.

СПИД



К наиболее распространенным симптомам относятся:

- лихорадка (повышенная температура);
- боль в горле;
- сыпь на теле.

Дополнительные симптомы могут включать:

- усталость;
- боли в суставах;
- мышечные боли;
- набухание лимфатических узлов.

5 фактов о СПИДе



■ Лекарств, способных полностью защитить человека от СПИДа, не существует



■ Про инфицирование можно узнать только по результатам ВИЧ-теста



■ Использование презерватива при сексе обеспечивает 98% защиты от инфицирования ВИЧ



■ СПИД – последняя стадия заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)



■ ВИЧ разрушает иммунную систему человека

Как защититься от инфекции



■ **Верность** остерегайтесь беспорядочных половых связей



■ **Искренность** будьте открытыми с партнерами



■ **Защита** при сексе используйте качественный презерватив, а при контакте с чужой кровью – защитные перчатки



■ **Безопасность** пользуйтесь только личными косметическими или гигиеническими принадлежностями



■ **Стерильность** медицинские должны быть продезинфицированы

Запомните, ВИЧ и СПИД – это не одно и то же. Отличия между ними заключаются не только в определениях, но и свойствах, признаках проявления, этапах развития.

Спасибо за внимание!

