



- Как уже отмечалось ранее, в первой половине XIX в. наибольших успехов в медицине и хирургии достигли врачи Франции, а во второй - их немецкие и австрийские коллеги. Однако в XX в. картина изменилась - лидерство себе обеспечили хирурги США. О нобелевском лауреате Алексисе Карреле было рассказано выше. Не меньшей известностью пользовались в США хирурги - братья Мейо.

Ағайынды **Вильям Джеймс Мейо** (1861-1939) және **Чарльз Гораций Мейо** (1865-1939) әйгілі Америка хирургы Вильяма Уоррала Мейо отбасында дүниеге келген. Екеуі де АҚШ та медициналық білім алған. Вильям 1883 жылы Мичиганский университетінің медициналық мектебін аяқтады, Чарльз 1888 жылы Чикагодағы Батыс университетін бітірді

**Чарльз Гораций Мейо** (19.7.1865— 26.5.1939, Чикаго),  
Чарльз 1888 жылы Чикагодағы Батыс университетін  
бітірді 1889 жылдан бастап Мейо клиникасының хирургы.

1914—1918 жылдары 1-ші дүниежүзілік соғыс кезінде  
АҚШ-тағы хирургиялық қызметтің бас кеңесшісі.  
Хирургиядағы негізгі қарастырған сұрақтары жемсау  
кезіндегі жасалатын операциялар,  
несепағар трансплантациясы, өт жолдарына  
жасалатын операциялар.

1916-1917 жылдары Америка медициналық  
ассоциациясының президенті.

- В брюшной хирургии братья Мейо разработали свой способ резекции желудка по методу «Бильрот II» (способ Мейо), способ закрытия культи двенадцатиперстной кишки (способ Мейо), способ резекции желудка по методу «Бильрот I» (способ Мейо-Горслея), способ дегастроэнтеростомии (способ Мейо-Успенского). Кроме того, они описали предпривратниковую вену, которая начинается в привратниковой части желудка, сопровождает правую желудочную артерию, вливается в воротную вену, собирает кровь от желудка (вена Мейо).

- В хирургии печени и желчевыводящих протоков они предложили доступ к желчным путям, при котором разрез в правом подреберье дополняют параректальным разрезом (доступ Мейо-Робсона-Кёрте), разработали операцию при неустранимой непроходимости общего желчного протока (операция Мейо), способы операции при портальной гипертензии - с перевязкой нижней брыжеечной или верхней прямокишечной вены либо с введением части большого сальника во влагалище прямой мышцы живота (способы Мейо).

- Братья Мейо разработали оперативный доступ к селезенке - параректальный разрез слева (доступ Мейо), а также способ операции при пупочных грыжах, при котором края апоневроза при сшивании накладывают один поверх другого, образуя дубликатуру (способ Мейо). Они являлись соавторами операции наложения двустороннего уретероанастомоза (операция Коффи-Мейо) и операции по поводу деформации стопы (операция Вредена-Мейо). Братья Мейо описали симптом опускания подбородка и смещения гортани книзу при вдохе как признак третьей стадии наркоза (симптом Мейо), изобрели ранорасширитель, состоящий из трех зеркал, два из которых фиксируются с помощью кремальеры, а третье закрепляется винтом (ранорасширитель Мейо-Симпсона-Коллена). Чарльз Мейо первым (1913) произвел симпатэктомию при грудной жабе.

- Клиника Мэйо – это известный медицинский центр и медицинская исследовательская группа, которая расположена в городе Рочестер (Миннесота, США).

Источник: <http://medbe.ru/clinics/kliniki-i-gospitali-ssha/lechenie-v-klinike-meyo-minnesota-ssha/>

© medbe.ru



- Немного об истории клиники В 1863 году 44-летний талантливый хирург Уильям Уоррел Мэйо (1819–1911) приехал в маленький городок Рочестер, чтобы помогать жертвам Гражданской войны. Это место пришлось ему по душе, и в 1864 году к доктору Мэйо присоединилась его семья.

Источник: <http://medbe.ru/clinics/kliniki-i-gospitali-ssha/lechenie-v-klinike-meyo-minnesota-ssha/>

© medbe.ru

- После войны доктор Мэйо открыл свою медицинскую практику, наряду с этим играя важную роль в жизни местной общины. Его сыновья Уильям Джеймс Мэйо (1861–1939) и Чарльз Хорас Мэйо (1865–1939) пошли по стопам отца, поступив в медицинскую школу.

Источник: <http://medbe.ru/clinics/kliniki-i-gospitali-ssha/lechenie-v-klinike-meyo-minnesota-ssha/>

© medbe.ru

- Братья Мэйо, как и их отец, совмещали врачебную практику с научной деятельностью. Всего Чарльз Мэйо опубликовал 162 научных работы, а его брат Уильям – 221, но братья не были «светилами» и корифеями, коллеги и пациенты называли их запросто: доктор Уилл и доктор Чарли.

- Братья Мэйо по личным воспоминаниям С.С. Юдина
- Из цикла: С.С. Юдин "В гостях у американских хирургов". Впервые опубликовано в журнале "Хирургия", 1940.
- 13 апреля 2016 г.
- Ушли из жизни великие братья Мейо. Они умерли в преклонном возрасте. Младший, Чарлз Мейо, скончался от пневмонии во время своей поездки в Чикаго 26.05.1939 в возрасте 73 лет. Старший, Уильям Мейо, умер в возрасте 78 лет, 28.07.1939, у себя дома в Рочестере; 22.04.1939 его оперировал по поводу прободной язвы желудка его зять Уолтман Уолтерс.



- *Лит.:* Wilson L. **W.**, **W.** Worrell Mayo, A pioneer surgeon of the Northwest, «Surgery gynecology and obstetricss», 1927, v. 44, May; Линберг Б. Э., Американская хирургическая клиника (по личным впечатлениям), **Мейо**, 1929; [Чарльз и Уильям Мейо]. Некролог, «Новый хирургический архив», 1939, т. 45, кн. 2; Юдин С. С., Братья Мэйо по личным воспоминаниям, «Хирургия», 1940, № 2—3.