

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЖИВОТНЫМИ-ПАРАЗИТАМИ

Подготовила студентка группы 17
Сейтхалилова Риана

Чесотка



Чесотка — заразная болезнь кожи, вызываемая особым видом клеща — чесоточным, который очень мал и едва различим глазом. Чесотку вызывает оплодотворенная самка. Попав на кожу человека, она прокусывает поверхностный слой кожи (надкожицу), в толще его, параллельно поверхности кожи, роет канал длиной 3–5 мм — так называемый чесоточный ход. В образующихся ходах самка откладывает яйца. Через несколько дней из яиц выводятся личинки, которые превращаются во взрослых клещей. Каждая самка за свою жизнь успевает отложить до 50 яиц.

Через 2 недели из яйца развивается самка, способная сама откладывать яйца. Через небольшие промежутки времени самка пробуравливает в крышке чесоточного хода отверстия, через которые выходят наружу молодые клещи. На поверхности кожи происходит оплодотворение молодых самок, которые затем прокусывают поверхностный слой кожи и внедряются в неё.

Вшивость

Вшивость — заразное заболевание, заключающееся в появлении вшей, паразитирующих на коже человека. Различают три рода вшей головных, платяных и лобковых. В парикмахерских наибольшее эпидемиологическое значение имеет головная вошь, которая поражает волосистую часть головы. Оплодотворенная самка откладывает яйца (гниды), выделяя при этом особое клейкое вещество, которым яички приклеиваются к волосам или коже.



Самка вши живет 1 месяц, но за этот срок она успевает отложить до 150 яиц. Молодые вши появляются через 8–12 дней, 3 недели спустя они способны производить потомство. Укусы вшей вызывают сильный зуд, который ведет к расчесам, развитию воспалительной красноты кожи на участках поражения волосистой части

Бородавки

Бородавки – одно из наиболее распространенных заболеваний кожи. Это – небольшие, чаще множественные, различной формы узелки, которые выступают над уровнем кожи. Располагаются бородавки обычно на открытых частях тела – на лице, на пальцах рук. Появившись, они держатся годами. От заражения до появления бородавок проходит около 4–5 месяцев.



Заразиться бородавками можно при непосредственном соприкосновении с больным или его вещами. Развитию заболевания способствуют ссадины и порезы на руках, расчески. Иногда бородавки возникают в местах трения. Прониканию вируса способствует также влажность кожи.