Респираторносинцитиальная инфекция КРС

Подготовила:

обучающаяся группы

B-c-o 163.1

Волк А. Е.

Определение заболевания

Респираторно-синцитиальная инфекция КРС (РСИ КРС, заразный кашель, пульмональная эмфизема) — это острая вирусная болезнь телят, характеризующаяся лихорадкой и поражением респираторных органов.

Является основной причиной ОРВИ КРС, в иностранной лит-ре применяется термин BRD (Bovine Respiratory Disease).


Историческая справка, распространение, экономический ущерб


Впервые респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) выделили в 1969 г. Веллеманс и Мунен в Бельгии. В США вирус был выделен в Айове и Миссури в 1974 г. РСИ широко распространена во всем мире, Мексике, Канаде, Герма- нии, Великобритании, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Бразилии, Эквадоре, Польше, Иране, России (с 1975 г.).

У молодняка крупного рогатого скота с респираторными поражениями на долю респираторно-синцитиальной инфекции приходится около 40 %.

Было подсчитано, что в Соединенных Штатах каждый год по причине BRD погибает примерно 32 млн голов крупного рогатого скота. Экономические потери оцениваются более чем в миллиард долларов.

Respiratory Syncytial Virus





Возбудитель

РНК-содержащий вирус из семейства Pneumoviridae (до 2016 г. относился к сем. Парамиксовирусов), рода Orthopneumovirus, виду Bovine orthopneumovirus. В АГ отношении все штаммы РСВ идентичны между собой и с вирусом человека.

Индуцирует образование **ВНА** (вывляются на 6 день и макс. -13-15 д.) и **КСА**.

Факторы патогенности: полипептиды (9 или 10, два из которых — G и F — гликозилированы и располагаются на поверхности вириона), маtrix protein (M) нуклеотид и др. компоненты вируса.

Существует два типа синцитиальных вирусов КРС:

- 1) синцитиальный вирус, тесно связанный с клетками. Отличается серологически от PCB KPC (BRSV);
- ВRSV выделен в ряде стран при респираторных вспышках болезни среди КРС. Впервые его выделили в 1969 г. в Бельгии Веллманс и Леннен из смывов верхних дыхательных путей больных телят (шт. V 220/69).

Культивирование

НЕ размножается на КЭ, хорошо репродуцируется в первичных культурах клеток почки, тестикул, легких и селезенки КРС. Вирус обычно выделяют в течение 3—4 пассажей, так как в первых генерациях выраженных **ЦП**Д не развивается.

Хорошо растет в культуре перевиваемых клеток слизистой оболочки носа КРС (линия M-57) в однослойной статической культуре и на микроносителях в перевиваемой культуре MDBK, а также диплоидных клеточных культурах щитовидной железы ягненка.

Добавление в питательную среду 2 % сыворотки КРС без специфических AT или 0,1 мг профлавина стимулирует развитие синцитиальных клеток, что способствует обнаружению ЦПД.

Респираторно-синцитиальный вирус не агглютинирует эритроциты КРС, овец, морских свинок, мышей.




Рисунок 2 (A) – ЦПД изолята вируса РСИ КРС на ПЛК ВТ (5 сутки, увеличение х400)

Рисунок 2 (Б) – ПЛК ВТ без инокуляции изолята вируса РСИ КРС (5 сутки, увеличение х400)

Устойчивость

Вирус слабоустойчив во внешней среде: при температуре 56 °C инактивируется в течение 30 мин, при 37 °C — через 24 ч, при 7 °C сохраняет активность 7 дней, при —70 °C — не менее 2 мес, разрушается при замораживании и оттаивании.

Два шт. РСВ КРС (Bov и Bov-х) оказались чувствительны к низким значениям рН.

Вирус чувствителен к эфиру, хлороформу, дезоксихолату, трипсину.

Эпизоотология



К вирусу восприимчив КРС всех пород и возрастов, но наиболее подвержены заболеванию телята от 1 мес до 1 г. (с клиническим проявлением).

Имеются многочисленные данные о возникновении вспышек и среди взрослого поголовья КРС, что может быть связано с механическим заносом возбудителя в стадо, где не применялись профилактические меры для предупреждения заноса РСИ КРС.

ИВИ – больные, переболевшие животные и вирусоносители.

Пути передачи – Аэ или Кт через выделения из глаз, носа и СО трахеи. Возможен внутриутробный путь.

Инфекцию регистрируют в **любое время года**, но <u>наивысшая заболеваемость отмечается осенью</u> и ранней зимой. Увеличение числа клинически больных животных наблюдают примерно через 30 дней после прибытия в хозяйство новой партии скота, о чем свидетельствует 4-кратный и более подъем титров AT.

РСИ КРС в большинстве регионов является эндемичной, заболеваемость достигает 80-100 %, а смертность — 5-10 %.


Патогенез

Возбудитель, попав на слизистые оболочки дыхательных путей, репродуцируется в клетках эпителия, что приводит к воспалению и нарушению кровообращения, выпотеванию серозной жидкости в просвет альвеол и бронхиол, развитию дистрофических и некротических изменений. На 3-6-й день после инфицирования в клетках слизистой оболочки носовой полости обнаруживают специфический антиген и гигантские клетки с включениями.

РСВ был назван из-за характерного цитопатического эффекта, а именно формирования в инфицированной синцитиальной ткани, гигантских многоядерных клеток, образующихся в результате слияния нескольких клеток. РСВ имеет склонность к нижнему отделу дыхательных путей, где он может вызвать различную степень пневмонии сам по себе. Вторичные бактериальные инфекции, часто с участием Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, вызывают тяжелые осложнения или смерть.

Вирус РСИ КРС заражает клетки мерцательного эпителия, выстилающие дыхательные пути, разрушая мукоцилиарный аппарат, который очищает дыхательные пути от патогенов и твердых частиц. Это создает благоприятную среду для развития секундарной бактериальной инфекции.

РСИ – пневония, метаморфоз альвеолярного эпителия



Течение и клинические признаки

Инкубационный период - 2-3 сут. Болезнь протекает чаще остро, в стационарно неблагополучных хозяйствах — бессимптомно. **Длительность болезни 3-8 дней.**

При внутриутробном заражении возможны аборты

Часто РСИ протекает в ассоциации с парагриппом-3, инфекционным ринотрахеитом, вирусной диареей, сальмонеллезом, эшерихиозом, пастереллезом, микоплазмозом и др.

Начало заболевания внезапное. У телят **при легкой форме** заболевания отмечается сухой кашель, серозно-слизистые истечения из носа, конъюнктивит и учащенное дыхание. Температура тела повышается до 41 °C, но нет никаких признаков общего дискомфорта. Выздоровление занимает около недели. **При тяжелой форме** — интерстициальная пневмония, бронхопневмония, отмечается угнетение, анорексия, общий дискомфорт, одышка, учащенное дыхание, дыхание ртом и лихорадка от 40 до 42 °C. Аускультация легких выявляет характерный треск, указывающий на эмфизему. Смерть может наступить в течение нескольких дней, несмотря на интенсивное лечение. Выздоровевшие животные часто отстают в развитии и имеют плохие ежедневные привесы.










Серозно - гнойный конъюнктивит.



Патологоанатомические изменения

При вскрытии отмечают гиперемию слизистой оболочки дыхательных путей. Бронхи пораженных сегментов иногда содержат слизь. Заметны признаки трахента (отечность и гиперемия слизистой оболочки трахеи, скопление в ее просвете пенистого экссудата, точечные и полосчатые кровоизлияния). Легкие кровенаполнены, слизистая их цианотична, с кровоизлияниями, краниовентральная часть легких уплотнена и отечна, выражена мелкоочаговая интерстициальная эмфизема. Бронхиальные и средостенные лимфатические узлы увеличены, гиперемированы, отечны, с кровоизлияниями.



Верхний участок трахеи в разрезе: резкая гиперемия слизистой с кровоизлияниями и обильные фибринозно – гнойные наложения.



Диагностика

В лабораторию направляют: сыворотку крови, пробы носовых выделений, экссудат из трахеи и бронхов, кусочки легких, бронхов, трахеи, бронхиальные и средостенные л/у.

Лабораторная диагностика включает:

- 1) обнаружение вирусного антигена в патологическом материале методом иммунофлюоресценции;
- 2) выделение вируса в культуре клеток и его идентификацию в РСК, РНГА, РИД, РН, реакции подавления бляшкообразования, ИФА, ПЦР, РТ-ПЦР/ОТ-ПЦР (с обратной транскриптазой), ELISA;
- 3) выявление прироста специфических антител в сыворотке крови реконвалесцентов в РИГА, РСК.
- Для диагностики используют выпускаемые биологической промышленностью диагностические наборы.
- При гистологическом исследовании респираторных путей выделяют гигантские синцитиальные клетки в бронхиолах, дегенерацию и некроз эпителиальных клеток бронхиол и легочной ткани, явления клеточной инфильтрации.







Bovine IBR-PI3-BRSV (ринотрахеит, парагрипп 3 и респиратирно-синцитиальная инфекция КРС)





Тест-система предназначена для выявления РНК вируса РСИ КРС методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в биологическом материале от животных, ...

КОМБОВАК Вакцина против инфекционного ринотражента, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной

Экспериментальное заражение

При интраназальном заражении телят РСВ в дозе 7,5-107 БОЕ на 5-й день развивалось слезотечение, истечение из носа, учащенное дыхание, угнетение и лихорадка, а также выраженная ингибиция миграции лейкоцитов периферической крови. Ингибиция достигала максимума к 2—3му дню после заражения. Мигрирующие клетки представляли собой полиморфноядерные лейкоциты периферической крови, которые чувствительны в реакции задержки миграции. У зараженных интраназально и интратрахеально телят в месячном возрасте через 3—5 дней вирусный АГ выявляли методом ИФ в цитоплазме зараженных клеток трахеи и бронхов, иногда в альвеолярных макрофагах и клетках, а также эпителиальных клетках носовой полости, носоглотки и бронхиол. Развившиеся у зараженных телят бронхиты и трахеиты характеризовались, помимо некроза, гиперплазией эпителиальных клеток, образованием клеточных синцитиев. Значительно реже наблюдали риниты, бронхиолиты и интерстициальную пневмонию. На 30-й день после заражения изменения исчезали. Таким образом, экспериментальная РСИ у телят сопровождается обратимыми изменениями эпителия респираторных путей и усилением фагоцитарной функции макрофагов.

При внутрикожном введении появлялась местная реакция гиперчувствительности замедленного типа со второго дня с максимальным утолщением кожи между 2- и 3-м днем после заражения. У зараженных телят РСВ выделяют из слизистой оболочки носа, бронхов и легких.

Диф. диагностика

- •парагрипп-3
- •аденовирусная инфекция
- инфекционный ринотрахеит
- •парвовирусная инфекция КРС
- •пастереллез
- •хламидиоз
- •вирусную диарею
- •коронавирусная инфекция

Иммунитет

Инфекция у телят в возрасте 1—3 месяцев на фоне материнских AT не стимулирует образование гуморальных AT, хотя в слизистой оболочке дыхательных путей появляются IgA. Инфицирование таких телят сопровождается появлением в респираторном тракте противовирусных IgM, IgA, IgG. Ускоренная их продукция отмечается при повторном заражении.

У переболевших животных вырабатываются специфические антитела (ВНА) и создается устойчивость к повторному заражению.

У телят вируснейтрализующие и комплементсвязывающие антитела выявляются с 5-го по 14-й день и играют защитную роль при титре не ниже 2 lg.

ВНА у привитых живой вакциной животных появляются на 5-й день и сохраняются после ревакцинации до 5 месяцев. Наличие AT почти не препятствует возникновению болезни. Видимо, велика роль местного иммунитета. Высокие титры ВНА (1:640) свидетельствовали о тяжести болезни. AT к PCB, полученные от матерей, не предохраняют телят от инфекции.

Специфическая профилактика







КОМБОВАК = π/κ или в/м коровам 3 мл, телятам — 2 мл.

Схема 1: коров и телок случного возраста дважды = за 4 и 1 неделю до осеменения, ревакцинируют перед отелом дважды = за 50-60 сут до отела и через 14-20 сут (не позднее 30 сут до отела). Телят вакцинируют в возрасте 30 сут дважды с интервалом 20-25 сут. Быков вакцинируют двукратно с интервалом 14-21 д каждые 6 мес.

Схема 2: Все поголовье ж-х старше 1 года прививают каждые 6 мес. с интервалом 14-21 сут. Не рекомендуется вакцинировать за 30 д. до отела и в теч. 3 недель после. Телят вакцинируют в возрасте 7-10 сут и старше дважды с интервалом 20-25 д. Ревакцинируют однократно в той же дозе в возрасте 6 мес.

КОМБОВАК-А и КОМБОВАК-Р применяют аналогично



ИНФОРС 3 - живая лиофилизированная вакцина.

Вакцину вводят интраназально в дозе 2 мл. В каждую ноздрю вводят по 1 мл вакцины. Вакцину можно вводить с помощью специальных многоразовых аппликаторов, которые поставляются отдельно. Телят, вакцинированных до 6-месячного возраста, следует ревакцинировать после достижения 6-месячного возраста с целью предотвращения возможной интерференции иммунизации со стороны материнских антител.

Ревакцинацию проводят ежегодно, однократно.



Вакцина ХИПРАБОВИС-4 против ринотрахеита (IBR), парагриппа-3 (PI3), вирусной диареи (BVD), респираторно-синцитиальной инфекции (BRS) крупного рогатого скота (живой и инактивированные компоненты). Вакцинации подлежат клинически здоровые животные в **возрасте старше 4-6 недель**, независимо от сроков лактации.

Зрелые коровы: рекомендуется массовая вакцинация, за 30 дней перед отелом (сухостойный период) или перед осеменением.

Телочки: наряду со зрелыми коровами, за 30 дней до осеменения.

Телята: активная иммунизация, когда пассивная колостральная защита начинает снижаться.

Вакцину вводят внутримышечно в область шеи или подкожно в подгрудок в объеме -3 мл, двукратно с интервалом 21-30 дней. Ревакцинацию животных проводят через 12 месяцев.





СУПРАВАК 10 - Инактивированная вакцина против возбудителей:

- инфекционного ринотрахеита (IBR-Bovine herpesvirus Type 1);
- вирусной диареи (BVD types 1 и 2);
- парагриппа-3 (PI3);
- респираторно- синтициальной инфекции (BRSV);
- лептоспироза, вызываемого: Л. Каникола (L.Canicola), Л. Гриппотифоза (L.Grippotyphosa), Л.Гарджи (L. Hardjo), Л. Иктерогемморагия (L.Icterohaemorrhagiae), Л.Помона (L. Pomona), Л. Вольфии (L.Wolffii);
- пастереллеза: П. гемолитика (Pasteurella haemolytica).

Иммунитет у животных развивается через 3-4 недели после двукратной вакцинации и сохраняется в течение не менее 6 месяцев. Лечебными свойствами не обладает.

Схемы вакцинации:

N₂1

10 месяцев после рождения

11 месяцев после рождения (телки случного возраста)

17 месяцев после рождения

Каждые 6 месяцев

Первая вакцинация

Вторая вакцинация через 30 дней после первой вакцинации

Ревакцинация

Ревакцинация

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

№2

Все поголовье	Все поголовье	Каждые 6 месяцев	
Первая вакцинация	Вторая вакцинация через 30 дней	Ревакцинация	Можно вакцинировать коров в сухостойный период для создания колострального иммунитеа у телят
5 мл	5 мл	5 мл	5 мл

Ревакцинация через каждые 6 месяцев.

Схему вакцинации нужно скорректировать в соответствии с титром колостральных антител. Вакцинацию рекомендуется начинать, как только уровень колостральных антител снизится ниже нейтрализующего.

^{*} Можно прививать стельных животных!



БиоБос Респи 2 — Живая вакцина предназначена для стимуляции активного иммунитета против респираторно-синцитиального вируса и вируса парагриппа 3 крупного рогатого скота.

1 дозу (2 мл) разбавленной вакцины вводят интраназально животным в возрасте 10 дней и старше с использованием специального аппликатор для интраназального введения. Для каждого животного рекомендуется использовать новый аппликатор с целью предотвращения передачи инфекции.

Иммунитет вырабатывается через 10 дней после однократной вакцинации. Иммунитет сохраняется в течение 12 недель после однократной дозы. Иммунитет вырабатывался после вакцинации животных с отрицательными результатами серологического исследования.

БИОБОС РЕСПИ 3

Вакцина против вируса парагриппа-3, респираторносинцитиального вируса крупного рогатого скота, бактерий Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, серотип A1. Вакцину вводят подкожно, в дозе 2 мл. Перед применением вакцину нагревают до температуры 20 - 25 ° С и тщательно встряхивают.

Первичная иммунизация: вакцинацию крупного рогатого скота рекомендуется проводить в возрасте 8 недель и старше, а повторную вакцинацию через 2- 4 недели (также можно прививать крупный рогатый скот в возрасте 2 недель и старше).

Ревакцинация: для проблемных пород рекомендуется проводить повторную вакцинацию в течение 6 месяцев после первичной вакцинации, до наступления рискованного периода у определенных пород (например, перевод животных, изменение условий стойлового содержания и т.д.).

Вакцинация стельных коров: вакцинация с последующей повторной вакцинацией в течение 7- 5 недель и 4-2 недель до ожидаемой даты родов в целях выработки резистентности и передачи потомству с молозивом. Допускается применение БиоБос Респи 3 в период стельности и лактации.





БИОБОС РЕСПИ 4

Вакцина против вируса парагриппа-3, респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого скота, вирусной диареи крупного рогатого скота и бактерий Mannheimia (Pasteurella) haemolytica. Вакцину вводят подкожно, в дозе 2 мл. Перед применением вакцину

Вакцину вводят подкожно, в дозе 2 мл. Перед применением вакцину нагревают до температуры 20 - 25 °C и тщательно встряхивают.

<u>Первичная иммунизация</u>: вакцинацию крупного рогатого скота рекомендуется проводить в возрасте 8 недель и старше, а повторную вакцинацию через 2- 4 недели (также можно прививать крупный рогатый скот в возрасте 2 недель и старше).

<u>Ревакцинация</u>: для проблемных пород рекомендуется проводить повторную вакцинацию в течение 6 месяцев после первичной вакцинации, до наступления рискованного периода у определенных пород (например, перевод животных, изменение условий стойлового содержания и т.д.).

Вакцинация стельных коров: вакцинация с последующей повторной вакцинацией в течение 7-5 недель и 4-2 недель до ожидаемой даты родов в целях выработки резистентности и передачи потомству с молозивом.



Вакцинации подлежат телята, начиная с 2-недельного возраста.

В неблагополучных хозяйствах телят иммунизируют двукратно с интервалом 4 недели. Вакцину вводят подкожно в объеме 5,0 мл (1 иммунизирующая доза) в область средней трети шеи.

В угрожающих по этим болезням хозяйствах, а также при вероятности заражения животных при транспортировке, вводе в другое стадо, смене помещений, вакцину вводят однократно за 2 недели до предполагаемого периода риска.

Бовилис® Бовипаст RSP (Bovilis® Bovipast RSP) - Вакцина против парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции и пастереллеза крупного рогатого скота, инактивированная.





Вакцина обеспечивает формирование напряженного иммунитета против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции КРС и пастереллеза КРС у вакцинированных животных через 14 суток после повторной вакцинации, который сохраняется 6 месяцев.

Вакцину «BOVIMAXX 4 Past» вводят внутримышечно по наружной поверхности бедра или в нижнюю треть шеи двукратно с интервалом 2-4 недели телятам с 20-дневного возраста, коровам, нетелям и быкам в дозе 5,0 см³. Второе введение вакцины тельным коровам и нетелям должно быть сделано не позднее чем за 3-4 недели до ожидаемого отела. Ревакцинация, то есть повторное введение вакцины, осуществляют через 6 месяцев. Температура препарата для введения должна быть в пределах от +15°C до +25°C. Перед применением вакцину необходимо взбалтывать.

vettorg.info



Бови-Шилд Голд Ван Шот представляет собой лиофилизированный препарат из аттенуированных живых штаммов вирусов ИРТ, ВД (тип 1 и 2), ПГЗ и РСИ и продукта, полученного от жизнедеятельности культуры М. Наетоlytica, которая продуцирует лейкотоксин и капсулы и клеточно-ассоциированные антигены. Стерильный растворитель содержит адъювант, который усиливает иммунный ответ и обеспечивает растворения лиофилизированной фракции вакцины.

Доза 2 мл животному подкожно в области шеи.

Первичная вакцинация:

Ввести одну дозу 2 мл здоровому животному. Для того, чтобы избежать препятствованию материнскими антителами образования поствакцинального иммунитета, телят, вакцинированных в возрасте до 6 месяцев, нужно будет ревакцинировать после 6-ти месячного возраста или после отлучения.

Ревакцинация:

Рекомендована ежегодная ревакцинация одной дозой.





Вакцина Vista Once SQ – против ИРТ, ВД (тип 1 и 2), РСИ, ПГ3, пастереллеза (гемолитика и мультоцида).

2 мл п/к с 3хмесячного возраста.

Безопасен для использования у беременных телок и коров или телят, кормящих беременных коров, при условии, что коровы и телкив стаде вакцинированы до размножения, в течение предыдущих 12 месяцев, любым из модифицированных живых IBR и BVD

Лечение

В настоящее время нет никаких конкретных противовирусных препаратов одобренных для лечения РСИ у крупного рогатого скота. Лечение РСИ состоит из трех этапов:

Первым шагом является <u>поддерживающая терапия.</u> Поддерживающая терапия состоит из защиты больного животного от обезвоживания, поддержания надлежащего баланса электролитов и содержания животного в чистом, хорошо вентилируемом помещении.

Второй шаг заключается в подавлении с помощью <u>противомикробных препаратов</u> секундарных инфекций, вызываемых патогенными микроорганизмами (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Mycoplasma bovis и др.), которые мо- гут развиваться в уже пораженных дыхательных путях больных животных.

Третьим шагом является использование противовоспалительных препаратов. Из-за иммуносуппрессивного действия кортикостероидов эти препараты не рекомендуется для использования в лечении крупного рогатого скота респираторных заболеваний. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются препаратами выбора.

В качестве средства специфического лечения применяют сыворотку крови реконвалесцентов, а также иммунокорректирующую сыворотку из крови доноров — комплексный препарат, сочетающий в себе все положительные качества специфической гипериммунной сыворотки и свойства иммуностимулятора. Иммунокорректирующую сыворотку применяют с профилактической и лечебной целями. При помощи специфических антител защищают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, проводя аэрозольную пассивную иммунизацию животных сывороткой крови животныхреконвалесцентов того же хозяйства в сочетании с антибиотиками. Параллельно применяют иммуномодуляторы и адаптогены: лигфол, фоспренил, тималин, миелопептид, иммунофан и др.

Удовлетворительные результаты получены при сочетанном применении 0,25%ного раствора трипсина в форме аэрозоля и подкожного введения сыворотки крови животных-реконвалесцентов, антибиотиков тетрациклинового ряда. Кроме того, применяют аэрозольно молочную кислоту, йодтриэтиленгликоль, йодид алюминия, хлорскипидар, хлорид йода и другие препараты.

Профилактика и меры борьбы

Профилактика заключается в соблюдении ветеринарно-санитарных правил; недопущении заноса инфекции в хозяйство; карантине вновь поступающих животных; своевременной диагностике болезни; изоляции больных и подозрительных по заболеванию животных; проведении дезинфекции.

В комплексах группы формируют только здоровыми животными из заведомо благополучных хозяйств с учетом их возраста и массы тела. При наличии большого числа хозяйств-поставщиков за каждым из них закрепляют отдельные помещения. Заполнение помещения проводят в течение 3-5 дней по принципу «все свободно — все занято». Перед заполнением такие помещения тщательно дезинфицируют, одновременно обрабатывают предметы ухода, инвентарь. В каждом помещении выделяют отдельную секцию, куда изолируют угнетенных и слабых телят. Перед комплектованием групп проводят серологические исследования с целью определения иммунологической структуры стада. В профилактике болезни особенно эффективна аэрозольная дезинфекция помещений (с использованием хлорамина, скипидара, йодтриэтиленгликоля и т.д.) в присутствии животных в первую неделю после комплектования групп.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!