Бактериальный вагиноз

выполнила студентка 5 курса 8 группы лечебного факультета Бахвалова Д.Ю. Бактериальный вагиноз(БВ) — клинический полимикробный невоспалительный синдром, возникающий в результате замены нормальной микробиоты влагалища (виды Lactobacillus spp., продуцирующие молочную кислоту и перекись водорода) на повышенную генерацию многочисленных видов облигатных и факультативных анаэробных микроорганизмов, например Bacteroides/Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., G. vaginalis и др. Существует мнение, что БВ — самостоятельная нозологическая форма заболевания



Синонимы: анаэробный вагиноз, неспецифический вагиноз, лактобациллез, аминокольпит, вагинальный дисмикробизм, дисбактериоз влагалища, гарднереллез.

В настоящее время в клинической практике не употребляются.

Эпидемиология

БВ — наиболее частая причина патологических вагинальных выделений у женщин репродуктивного возраста, однако нечасто он может наблюдаться у девочек до менархе и женщин в период менопаузы. БВ встречается в различных популяциях женщин от 16 до 65%, у 15—37% беременных, а при патологических белях до 87% Заболевание не представляет непосредственной опасности для женщин, однако является:



фактором риска развития осложнений беременности:

- -самопроизвольные аборты
- -внутриамниотической инфекции
- -преждевременного излития околоплодных вод
- -преждевременных родов
- -рождения детей с низкой массой тела

одной из причин развития:

-инфекционных осложнений

после гинекологических

операций и абортов

-воспалительных заболеваний

органов малого таза

- -перитонита
- -абсцессов органов малого

таза при введении


внутриматочных

контрацептивов

Этиология и патогенез

Нормобиоциноз влагалища:

- В структуре биоценоза влагалища здоровых женщин насчитывается более 40 видов микроорганизмов, общее количество микроорганизмов 10'7-10'9 КОЕ/мл
- Доминируют Lactobacillus (90-95%)-высокий процент Н2О2-продуцирующих; остальные 5-10% представлены облигатными анаэробными и, в меньшей степени, факультативно-анаэробными, аэробными и микроаэрофильными бактериями.



- Продукция антимикробных субстанций (Н2О2, лизоцим, лизин, молочная кислота)
- Лактобактерии расщепляют гликоген с образованием молочной кислоты, обеспечивающая кислую среду во влагалище рН 4,0-4,5
- Лактобактерии конкурируют с другими микроорганизмами за возможность адгезии к клеткам влагалищного эпителия.
- Формирование защитного механизма местного иммунитета

Этиология и патогенез

Бактериальный вагиноз:

- БВ-ассоциированные облигатные анаэробы достигают 10'10 10'11 КОЕ/мл
- Количество лактобактерий незначительное (до 10'4 КОЕ/мл) или из полное отсутствие
- При недостатке лактобактерий снижается концентрация молочной кислоты, рН влагалища сдвигается в щелочную сторону pH>4,5.
- G.vaginalis вырабатывает ваголизин, действующий на эпителий влагалища цитотоксически и усиливающий активность гарднерелл более чем в 250 раз.

Кроме того, G.vaginalis в ассоциации с Lactobacterium iners могут вырабатывают цитолизин, разрушающий клетки влагалищного эпителия.

- Вследствие цитолиза избыточные углеводы становятся субстратом для синтеза жирных кислот с короткой углеводной цепью (С3-С6) маркерных метаболитов БВ.
- Формируется замкнутый круг: пул свободной глюкозы истощается, запасы гликогена не восполняются, деструкция эпителиальных клеток влагалища усиливается, рН смещается в щелочную сторону
- Угнетение иммунной защиты

Эндогенные факторы риска

- гормональные изменения (возрастные в пубертатном периоде и менопаузе; при патологии беременности; в послеродовом и послеабортном периодах)
- гипотрофия и атрофия слизистой оболочки влагалища, наличие кист и полипов стенок влагалища, гименальной области,
- нарушения рецепторной функции вагинального эпителия,
- снижение концентрации перекиси водорода в вагинальной среде за счёт уменьшения концентрации лактобацилл

Экзогенные факторы риска

- инфицирование возбудителями ИППП и колонизация половых путей генитальными микоплазмами,
- лекарственная терапия

 (антибактериальными,
 цитостатическими,
 глюкокортикостероидными,
 антимикотическими препаратами),
- лучевая терапия;
- присутствие инородных тел во влагалище и матке;
- пороки развития половых органов или их деформации после родов и хирургических вмешательств;
- нарушение гигиены половых органов, в том числе, частое применение спринцеваний и вагинальных душей;
- использование спермицидов.

Клиническая картина

Субъективные симптомы(жалобы):

- -обильные выделения с запахом несвежей рыбы, который может усиливаться после попадания спермы или мыльного раствора во влагалище -дискомфорт в области наружных половых органов
- -болезненность во время половых актов
- -редко встречаются жжение, зуд, раздражение вульвы, болезненность при мочеиспускании (дизурия).

Объективные симптомы:

- БВ проявляется обильными гомогенными жидкими неприятно пахнущими выделениями белого или светло-серого оттенка, нередко с пузырьками газа, сплошным слоем покрывающими стенки влагалища
- -Признаки воспаления слизистой оболочки влагалища (гиперемия, отек), как правило, отсутствуют.



Критерии постановки диагноза

Диагноз устанавливается на основании наличия не менее чем 3-х из 4-х критериев (критерии Amsel):


- 1. Выделения из влагалища густые, гомогенные, беловато-серые, с неприятным запахом;
- 2. При измерении рН влагалищной жидкости с помощью индикаторных полосок Кольпо-тест рН показатель кислотности сдвигается в щелочную сторону от 4,5 до 7,5.
- 3. Положительный аминовый тест появление или усиление неприятного запаха несвежей рыбы при смешивании 10% раствора гидроокиси калия (10% раствор КОН) с влагалищной жидкостью
- 4. обнаружение «ключевых» клеток при микроскопическом исследовании вагинального отделяемого.

Лабораторная диагностика


1. Микроскопия нативных и/или окрашенных по Граму биологических материалов (влагалищная жидкость, соскоб эпителия влагалища, шейки матки), полученных из верхней трети боковых сводов влагалища.

Для диагностики БВ необходимо отмечать наличие/отсутствие следующих признаков:

- уменьшение количества или исчезновение лактобацилл – грамположительных палочек различной длины и толщины;
- увеличение количества смешанной микробной (не лактобациллярной) микрофлоры;
- наличие «ключевых» клеток поверхностных клеток вагинального эпителия с адгезированными на них бактериями, за счет чего эпителиальная клетка имеет «зернистый» вид. Края «ключевых» клеток выглядят нечеткими или «пунктирными» вследствие адгезии мелких грамотрицательных или грамвариабельных палочек, кокков, коккобацилл и других бактерий;
- отсутствие местной лейкоцитарной реакции (у большинства пациенток количество полиморфноядерных лейкоцитов в вагинальном отделяемом на превышает 10-15 клеток в поле зрения).



«ключевая» клетка



G. vaginalis:

- 1 вариант нормы;
- 2- «ключевая» клетка при БВ в фиксированном мазке

Лабораторная диагностика

- **2. Культуральное исследование.** Рутинное культуральное исследование для верификации диагноза БВ не используется, однако может применяться для определения видового и количественного состава микробиоты влагалища, в том числе:
- выделения и идентификации G. vaginalis;
- выделения и идентификации других факультативных и/или облигатных анаэробов;
- выделения и идентификации лактобацилл (при БВ наблюдается отсутствие роста лактобацилл или резкое снижение их количества (<104 КОЕ/мл));
- выделения и идентификации M. hominis и Ureaplasma spp.
- **3. Молекулярно-биологические методы исследования**, направленные на обнаружение специфических фрагментов ДНК микроорганизмов, с использованием тест-систем, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации, используются для выявления лактобацилл, A. vaginae, G. vaginalis, M. hominis и Ureaplasma spp. и других, в том числе трудно культивируемых бактерий.

Консультации других специалистов (гинеколога-эндокринолога, эндокринолога, гастроэнтеролога) рекомендованы в случае частого рецидивирования бактериального вагиноза с целью исключения сопутствующих заболеваний (состояний), которые могут способствовать нарушению нормальной вагинальной микробиоты.

Лечение

(источник: Клиничсекие рекомендации по диагностике и лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей, издание 2-е, 2019г.)

Лечение небеременных женщин репродуктивного возраста

1. Одноэтапная терапия

Рекомендованные схемы:

- Метронидазол по 500 мг per os 2 раза в день в течение 7 дней
- Метронидазол 0,75% гель один полный аппликатор (5 г) per vaginam однократно в течение 5 дней
- Клиндамицин 2% вагинальный крем один полный аппликатор (5 г) однократно на ночь в течение 7 дней

Альтернативные схемы:

- Тинидазол 2 г per os 1 раз в день в течение 2 дней
- Тинидазол 1 г per os 1 раз в день в течение 5 дней
- Клиндамицин 300 мг per os 2 раза в день в течение 7 дней
- Клиндамицин овули 100 мг вагинально 1 раз на ночь в течение 3 дней

Лечение

2. Двухэтапная терапия:

Рекомендованная схема:

1-й этап

- Хлоргексидин 16 мг per vaginam по 1 суппозиторию 2 раза в день 10 дней и/или Молочная кислота 100 мг per vaginam по 1 суппозиторию 1 раз в день в течение 10 дней

2-й этап

- Лактобактерии (Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini Lcr-35) per vaginam по 1 вагинальной капсуле 2 раза в день в течение 7 дней или по 1 вагинальной капсуле 1 раз в день в течение 14 дней

Альтернативная схема:

1 этап

- Орнидазол 500 мг + Неомицин65000 МЕ + Эконазол 100 мг + Преднизолон 3 мг (комбинированный
- препарат) per vaginam по 1 вагинальной таблетке в течение 6—9 дней 2 этап
- Лактобактерии ацидофильные (Lactobacillus acidophilus) per vaginam по 1 вагинальному суппозиторию 2 раза в день в течение 5—10 дней

Лечение беременных женщин с диагнозом БВ

Важно:В России метронидазол и клиндамицин разрешены только со II триместра беременности!

- метронидазол 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7 дней, назначается со второго триместра беременности
- метронидазол 250 мг перорально 3 раза в сутки в течение 7 дней, назначается со второго триместра беременности
- - клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7 дней

Лечение в I триместр:

- 1-й этап
- Хлоргексидин 16 мг per vaginam по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение 10 дней
- Молочная кислота 100 мг per vaginam по 1 суппозиторию 1 раз в день в течение 10 дней
- 2-й этап
- Лактобактерии (Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini Lcr-35) per vaginam по 1 вагинальной капсуле 2 раза в день в течение 7 дней или по 1 вагинальной капсуле 1 раз в день в течение 14 дней

При лечении кормящих женщин метронидазолом однократной дозой 2 г не следует прикладывать ребенка к груди во время всего курса лечения и в течение 12—24 ч после окончания терапии. Более низкие дозы создают более низкую концентрацию в грудном молоке и считаются совместимыми с кормлением грудью.

Эффективность лечения

- оценивается по исчезновению субъективных проявлений, динамике клинических симптомов, нормализации лабораторных показателей.
- первое контрольное клинико-лабораторное обследование следуют проводить через неделю после завершения терапии, повторное - через 4-6 недель
- во время лечения и контрольного наблюдения следует рекомендовать использование барьерных методов контрацепции(презерватив)