



Психический травматизм

Будь осторожен

Обморожени

е

- Как избежать обморожения.
- одевайтесь как «капуста» — при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;
- — верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;
- — пользуйтесь помощью друга — следите за лицом друга, особенно за ушами, носом и щеками;
- — не позволяйте отмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи;
- — не снимайте на морозе обувь с отмороженных конечностей — они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками;

Признаки обморожения

1. Кожа белеет а затем краснеет и прибухает появляется покалывание и боль
2. Образуются волдыри с кровяными содержимым возникает сильная боль.
3. Происходит омертвление кожи и подкожных тканей.
4. Развивается омертвление глубоко расположенных костей и тканей



е

Резкая боль в месте растяжения, усиливающаяся при попытке движения в поврежденном суставе и надавливании на поврежденную связку. ...
Отек травмированной конечности, который локализуется в проекции поврежденного сустава и быстро нарастает. ...
Ограничение движений.



ушиб ы

Ушибы

При ушибах глубокие слои кожи и подкожной жировой клетчатки повреждаются из-за сильного удара. Кровь из поврежденных сосудов пропитывает мягкие ткани, поэтому в месте травмы уже в течение часа возникают кровоподтеки. Последствия легкого ушиба проходят в течение 7–10 дней, сильного — до месяца.

Как распознать

Ощутимая болезненность при надавливании. Кровоизлияние на месте ушиба — сине-фиолетовое пятно, темнеющее и растущее в размерах, при касании начинает болеть. Плотная припухлость в зоне кровоподтека.



Черепно- мозговые травмы

Черепно-мозговые травмы

Частный случай перелома — повреждение костей черепа. Если при этом страдает головной мозг и нарушается его нормальная работа, полученная травма называется черепно-мозговой (ЧМТ). Как правило, она возникает от механических повреждений в момент падения и сильного удара головой. Самые частые ЧМТ в сезон гололедицы — это сотрясение и ушиб головного мозга.

Как распознать

Потеря сознания или нарушение ориентации в пространстве и восприятия происходящего.

Сильное головокружение — вплоть до невозможности встать.


Тошнота.

Головная боль, слабость.

Потеря памяти на короткое время.

Двоение в глазах или другие расстройства зрения.

Такие симптомы возникают при сотрясении мозга и более серьезных черепно-мозговых травмах — например, при ушибе головного мозга и переломе основания черепа.



ВНИМАНИЕ, ГОЛОЛЕД!

Как не травмироваться на скользкой дороге

✗ во время таяния льда и снега берегитесь сосулек – не ходите под стенами домов

✗ не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения и получения травм

✗ не перебегайте проезжую часть

обувь должна иметь глубокий протекторный рисунок на подошве

ходите по тротуарам, посыпанным песком или солью

ступая на лед, максимально нагружайте носок, а не пятку

выбирайте освещенные участки дороги

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях

выбирайте внутренний край тротуара с непротопанным снегом

Главное будьте осторожны



Благодаря за внимание

Будьте осторожны



Автор: Черухина Рита