

Можно ли предотвратить или замедлить прогрессирование заболевания?

Министерство здравоохранения Рязанской области

Хроническая почечная недостаточность

ГБУ РО «Центр общественного здоровья, материнства и детства»

магистр

г. Рязань 2021

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) -	Этноа чс оа слтеобяон ли е з, нпър им ок ожтеотрпормовт еркеазтуьлбьет ас ст еи мппртоог мр ено	
Факторы риска развития ХПН:	?Слабость , утомляемость, головная боль;	?Выполнение рекомендаций диетолога.
? Табакокурение и злоупотребление	?Оедмы; ш к а и боли за грудиной;	? При нормальных показателях артериальн
?Употребление наркотиков;	?Сухость во рту;	?Медикаментозное лечение направлено
?Самолечение;	?Отсутствие аппетита;	?На более поздних стадиях ХПН для лече
?Профессиональные контакты с органическими растворителями, солями тяжелых металлов и др. токсинами;		
?Ожирение;	?Извращение вкуса;	
?Сахарный диабет;	?Аммиачный запах изо рта;	
?Артериальная гипертония;	?Кровоточивость;	
?Злоупотребление белковой пищей и	белковое истощение артериального давления;	
?Малоподвижный образ жизни;	?Переломы костей от небольших нагрузок;	
?Недостаточное потребление жидкости;	?Пневмония	
?Наследственная предрасположенность и врожде?	При подозрении на развитие ХПН пациенту необходима консультация нефролога и ряд исследова	
	наыбеоарнаотморалниые. исследования (анализы мочи и крови);	
	? Измерение артериального давления (АД);	
	?Ультразвуковое исследование почек;	
	?Рентгенологическое исследование;	
	?Компьютерная томография;	
	?Исследование глазного дна.	