

Можно ли предотвратить или замедлить прогрессирование заболевания?

Министерство здравоохранения Рязанской области

Хроническая почечная недостаточность

ГБУ РО ?Центр общественного здоровья, м

маци

г. Рязань 2021

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) -	Этноа чс оа слтеобяон ли е з, нпър им ок ожтеотрпормовт еркеазтуьлбьет ас ст еи мппртоог мр ено	
Факторы риска развития ХПН:	Слабость, утомляемость, головная боль;	Выполнение рекомендаций диетолога.
Лечение болезни	Оедмы; ш к а и боли за грудиной;	При нормальных показателях артериальной гипертензии
? Табакокурение и злоупотребление алкоголем;	Сухость во рту;	Медикаментозное лечение направлено
? Употребление наркотиков;	Отсутствие аппетита;	На более поздних стадиях ХПН для лече
? Самолечение;		
? Профессиональные контакты с органическими растворителями, солями тяжелых металлов и др. токсинами;	Извращение вкуса;	
? Ожирение;	Аммиачный запах изо рта;	
? Сахарный диабет;	Кровоточивость;	
? Артериальная гипертензия;	Переломы костей от небольших нагрузок;	
? Злоупотребление белковой пищей и белковое истощение артериального давления;	Стоматит;	
? Малоподвижный образ жизни;	Пневмония	
? Недостаточное потребление жидкости;	При подозрении на развитие ХПН пациенту необходима консультация нефролога и ряд исследова	
? Наследственная предрасположенность и врожденная почечная недостаточность;	Наиболее информативные исследования (анализы мочи и крови);	
	Измерение артериального давления (АД);	
	Ультразвуковое исследование почек;	
	Рентгенологическое исследование;	
	Компьютерная томография;	
	Исследование глазного дна.	