


ВИЧ- ИНФЕКЦИЯ... СЕГОДНЯ



ЧТО
ТАКОЕ
«ВИЧ»,
«ВИЧ-
ИНФЕКЦИЯ» И
«СПИД» ?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВИЧ-инфекция – заболевание, развивающееся у человека после инфицирования вирусом иммунодефицита человека

СПИД- это самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, при которой иммунитет человека разрушен вирусом настолько, что человек начинает страдать от различных инфекционных и онкологических заболеваний.

СПИД – это ВИЧ-инфекция без лечения.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИЧ ?

При проникновении в организм человека вирус поражает клетки иммунной системы.

По мере ослабления иммунитета организм становится более уязвимым для различных инфекций и опухолей (т.е. вторичных заболеваний).

Без приема антиретровирусных препаратов, подавляющих размножение вируса иммунодефицита, инфицированные лица умирают в среднем через 9-11 лет.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ ?

Источник ВИЧ-инфекции - только человек на всех стадиях заболевания.

ВИЧ передается только тремя путями:

- «кровь в кровь» (преимущественно через иглы и шприцы, загрязненные кровью больного ВИЧ-инфекцией);
- половым путем (при любом незащищенном половом контакте, т.е. без презерватива);
- от матери ребенку (во время беременности, в родах и при грудном вскармливании).

КТО В ГРУППЕ РИСКА ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ?

• ВИЧ касается каждого при:

- незащищенных половых контактах;
- при употреблении наркотических и других психоактивных веществ, особенно при их внутривенном использовании.

К уязвимым группам по ВИЧ относятся:

- подростки и молодежь;
- лица, ведущие половую жизнь;
- беспризорные дети, лица без определенного места жительства, мигранты;
- лица, находящиеся в местах лишения свободы;
- медицинские работники.

КАК
ОБНАРУЖИТЬ
ВИЧ-
ИНФЕКЦИЮ ?

- **Единственный способ** -
это провести анализ
крови на антитела к
вирусу
иммунодефицита
человека.

СКРЫТЫЙ ПЕРИОД ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

С момента заражения до первых проявлений ВИЧ-инфекции проходит от 3-4 недель до нескольких лет. Достаточно длительное время человек не ощущает этого заболевания: работает, занимается спортом, ведет активную половую жизнь, создает семью.

По внешним признакам невозможно определить, заражен человек ВИЧ или нет.

Не существует специфических признаков заражения ВИЧ.

ЧТО ПОВЫШАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ?

- - Частая смена полового партнера;
- - Случайные половые связи;
- - Половые связи с представителями своего пола;
- - Употребление алкоголя, наркотических веществ (традиционных, синтетических, растительных);
- - Использование инструментария для маникюра и татуировок, недостаточно обработанного после обслуживания ВИЧ-инфицированного;
- - Использование «общих» шприцев и игл для инъекций.

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ

Добиться «очищения» организма от вируса иммунодефицита человека если произошло заражение – НЕВОЗМОЖНО.

ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ – снизить активность вируса, а не избавиться организм от вируса.

Своевременно начатое лечение, назначенное в Центре СПИД, предотвращает развитие иммунодефицита и вторичных заболеваний, сохраняет качество жизни.

Только на фоне специфической терапии продолжительность жизни пациента с ВИЧ-инфекцией не отличается от продолжительности жизни лиц без ВИЧ-инфекции.

Лечение ВИЧ-инфекции пожизненное и бесплатное за счет средств государства.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ- ИНФЕКЦИЕЙ

Регулярно обследоваться на ВИЧ (не реже 1 раза в год)

Вступать в половые связи с партнером, обследованным на ВИЧ

Использовать презервативы при половых контактах

Отказаться от использования психотропных и наркотических веществ в немедицинских целях

Исключить использование нестерильных шприцев, игл и прочего инструментария.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**

