
**СИНДРОМ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ
К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ.**

РМАНПО - 2020

ВАРИАНТЫ ПВ к ПАВ

- первичное патологическое влечение к ПАВ**
 - вторичное патологическое влечение к ПАВ**
 - первый вариант**
 - второй вариант**
-

Первичное патологическое влечение к ПАВ

Рубежом перехода в патологию является начало преобладания мотивации влечения, изменение деятельности с целью удовлетворения потребности в ПАВ, которое становится обязательным.

Мотивы употребления психоактивных веществ

- **Атарктические** – использование ПАВ с целью смягчения или устранения явлений эмоционального дискомфорта (сниженного настроения).
- **Гедонистические** – использование ПАВ с эйфоризирующей целью (получение наслаждения).
- **Активационные** – использование ПАВ с целью вывода из состояния пассивности, апатии.
- **Субмиссивные** - использование ПАВ из-за нежелания оказаться «вне коллектива», т.е. «за компанию».
- **Псевдокультуральные** – использование ПАВ, вследствие культуральных, эстетических установок.

Мотивы и способы удовлетворения потребностей

- **редукция напряжения**
 - **изменение аффективного состояния**
 - **получение удовольствия**
 - **повышение самооценки и самоуважения**
 - **компенсация**
 - **общение**
 - **межличностная защита – манипулирование**
 - **научение**
 - **подражание**
-

Первичное патологическое влечение к ПАВ

В отличие от нормального, патологическое влечение к ПАВ является самодовлеющим и господствующим мотивом поведения.

Опьянение становится:

- самоцелью,
- смыслообразующим мотивом поведения,
- квазипотребностью.

Виды патологического влечения к ПАВ

- обсессивное - компульсивное
- одолимое – неодолимое
- парциальное – генерализованное
- периодическое (пароксизмальное) – постоянное
- ассоциированное (ситуационное) – аутохтонное
- осознанное - неосознанное
- экзогенное - эндогенное

Признаки патологического влечения к ПАВ

- беспричинные колебания настроения
- снижение настроения
- чувство неудовлетворенности
- мимические изменения
- беспокойство
- тревога
- дисфория
- астения
- анорексия
- напряжённость
- раздражительность
- агрессивность
- бессонница
- депрессия

Признаки патологического влечения к ПАВ

- состояние дискомфорта
- физическую слабость
- изменение структуры памяти
- нарушение когнитивных процессов
- мысли, навязчивого характера
- сновидения наркотического содержания
- эмоциональные нарушения
- вегетативно-рефлекторные проявления,
- гиперактивность
- поиск сильных ощущений
- скука
- тягостные размышления

Компоненты патологического влечения к ПАВ

- аффективный
- вегетативный
- идеаторный
- поведенческий
- сенсорный

Степень тяжести патологического влечения к ПАВ

- лёгкая
 - средняя
 - тяжёлая
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (лёгкая степень выраженности)

АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Депрессивная симптоматика. Пасмурный внешний вид, пассивность, неразговорчивость.
- 2) Тревога. Озабоченность по различным конкретным поводам.
- 3) Эмоциональная лабильность. Перепады настроения незначительны и непродолжительны. Слезы и омраченность пациента только при обсуждении неприятных для него вопросов.
- 4) Дисфория. Недовольство, ворчливость, угрюмость, мрачное настроение.

Проявления патологического влечения к ПАВ (лёгкая степень выраженности)

ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Наркотические сновидения, нарушение сна. Спокойная констатация сновидений с наркотической тематикой. Могут быть трудности при его воспроизведении.
 - 2) Мимические реакции. Мимические реакции при обсуждении наркотических тем сознательно подавляются.
 - 3) Изменение аппетита. Неустойчивость аппетита.
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (лёгкая степень выраженности)

ИДЕАТОРНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Симптоматика, отражающая отношение к ПАВ. Эпизодические появляющиеся мысли (воспоминания) о ПАВ.
 - 2) Симптоматика, отражающая отношение к болезни. Частичная критика к болезни.
 - 3) Симптоматика, отражающая отношение к лечению. Сомнения в необходимости лечения. Ситуационная необходимость госпитализации.
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (лёгкая степень выраженности)

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Тяготится режимом
- 2) Просьбы о дополнительном лечении.
- 3) Горячность, показной пафос в осуждении потребителей ПАВ.
- 4) Гиперактивность и хлопотливость в попытках отвлечься от мыслей о ПАВ.
- 5) Смакование наркотической тематики в беседах.
- 6) Несобранность, забывчивость, непоседливость.

Проявления патологического влечения к ПАВ (средняя степень выраженности)

АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Депрессивная симптоматика. Избегает общения из-за отсутствия интереса. Жалобы на скуку, однообразие жизни. Избегает всякой деятельности. Медлительность, вялость. Фиксация на жизненных невзгодах и понесенных обидах.
 - 2) Тревога. Мрачные предчувствия, пугающая неопределенность будущего, неуверенность в собственных силах
 - 3) Эмоциональная лабильность. Взволнованность в течение всей беседы и некоторое время после нее
 - 4) Дисфория. Напряженность, раздражительность, ощущение внутреннего дискомфорта, чувство угнетенности (проявляется при беседе).
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (средняя степень выраженности)

ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Наркотические сновидения, нарушение сна. Яркое наркотическое сновидение, оставляющее сильное впечатление.
 - 2) Мимические реакции. Оживление мимических реакций при обсуждении наркотических тем.
 - 3) Изменение аппетита. Стойкое снижение или повышение аппетита.
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (средняя степень выраженности)

ИДЕАТОРНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Симптоматика, отражающая отношение к ПАВ.
Частые возвращения к мыслям о ПАВ.
 - 2) Симптоматика, отражающая отношение к болезни.
Формальная критика к болезни.
 - 3) Симптоматика, отражающая отношение к лечению.
Мнение о нецелесообразности лечения.
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (средняя степень выраженности)

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Недовольство режимом, желание ускорить выписку из больницы.
- 2) Стремление уклониться от лечения.
- 3) Изменение круга общения (общение с пациентами, не настроенными на лечение).
- 4) Не сразу включается в беседу. Медленно осмысливает вопросы. С трудом переключается на другие темы.
- 5) Суетливость, рассеянность. Неустойчивость и непоследовательность в повседневных делах.

Проявления патологического влечения к ПАВ (тяжёлая степень выраженности)

АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Депрессивная симптоматика. Подавленность, жалобы на плохое настроение, безразличие к окружающему, утрату эмоциональных контактов, нежелание чем-либо заниматься, стремление к залеживанию в постели, неряшливость.
 - 2) Тревога. Напряженное ожидание надвигающегося срыва. Ощущение беспомощности. Не находит себе места, неусидчив, беспокоен, назойлив.
 - 3) Эмоциональная лабильность. Обидчивость, капризность, в течение всего дня.
 - 4) Дисфория. Подавленность, напряженность, взрывчатость, агрессивность (проявляется спонтанно).
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (тяжёлая степень выраженности)

ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Наркотические сновидения, нарушение сна. Поверхностный сон, частые пробуждения. Яркие будоражающие наркотические сновидения.
- 2) Мимические реакции. При обсуждении наркотических тем выраженные мимические реакции.
- 3) Изменение аппетита. Анорексия, булимия, жажда.

Проявления патологического влечения к ПАВ (тяжёлая степень выраженности)

ИДЕАТОРНЫЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Симптоматика, отражающая отношение к ПАВ.
Постоянные размышления о ПАВ.
 - 2) Симптоматика, отражающая отношение к болезни.
Отсутствие критики к болезни.
 - 3) Симптоматика, отражающая отношение к лечению.
Уверенность в ненужности и бессмысленности лечения.
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (тяжёлая степень выраженности)

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

- 1) Враждебность, оппозиция к персоналу.
 - 2) Стремление немедленно выписаться.
 - 3) Обращения с жалобами на тягу к ПАВ.
 - 4) «Эксперименты» с ПАВ.
-

Проявления патологического влечения к ПАВ (тяжёлая степень выраженности)

СЕНСОРНЫЙ КОМПОНЕНТ

- «руки тянутся»
- «стоит перед глазами»
- «дыхание перехватывает»
- «сердце ёкает»
- «зубы сводит»
- «спазмы в животе»