

ДЕМЕНЦИЯ

**Деменция** (лат. *dementia*) приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Деменция проявляется в нарушении интеллекта, мышления, памяти, понимания, речи и других познавательных функций. Чаще всего заболевание прогрессирующее, может приводить к инвалидности. В наибольшей степени деменция затрагивает лиц старшего возраста.

# По месту поражения выделяют:

## **корковую**

с преимущественным поражением коры головного мозга (болезнь Альцгеймера – это нарушение памяти)

## **подкорковую**

(болезнь Гентингтона-хроническое заболевание нервной системы, передающееся по наследству, непроизвольными движениями, кривляния. болезнь Паркинсона( дрожание, скованность мышц, замедленность движений, неустойчивое равновесие, больных СПИДом.

## **корково-подкорковую**

(болезнь с тельцами Леви у лиц старше 60 лет, замедленность движений нарушение сна, а именно: сонливость в дневное время суток, бессонница в ночное время.

# Причины развития деменции

Инфекции  
головного мозга  
—  
менингококковая  
инфекция,  
микробактерии  
туберкулеза,  
энцефалит,  
осложненные  
корь, краснуха,  
паротит, другие  
инфекционные  
заболевания  
нервной  
системы,  
поражающие  
интеллект.

Серьезные  
черепно-  
мозговые  
травмы.

Нарушение  
мозгового  
кровообраще-  
ния.

ВИЧ-  
инфекция.

Отравление  
медицинским  
и  
препаратами.

Опухоли  
головного  
мозга.

Вследствие  
генетических  
заболеваний.

# Симптоматика в разном возрасте

## Период раннего детства (от года до 3-х лет)

Деменция проявляется потерей уже приобретенных умений.

Ребенок перестает говорить.

Не может пользоваться столовыми приборами, хотя до проявления заболевания умело держал в руках ложку и вилку.

По мере прогрессирования деменции снижается двигательная активность, а позже ребенок и вовсе разучивается ходить.

Страдает эмоциональная сфера – появляются симптомы аутизма, теряется чувство близости с родителями и другими близкими.

Наблюдаются изменения в поведении ребенка – от возбудимости и агрессии по отношению к окружающим, до немотивированной радости.

## В дошкольном возрасте (от 3-х до 7-ми лет)

Деменция выражается в искажении процесса ведущего вида деятельности для дошкольников – в игре.

Игра становится бессюжетной и однообразной;

Характерна утрата ранее приобретенных КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ;

Патологические изменения поведения.

Ребенок с аутизмом

# Виды детской деменции

## Резидуально- органическая (вторичная)

Является следствием и остаточным проявлением различных поражений развивающегося головного мозга.

Динамика патологических изменений будет зависеть от возраста, в котором ребенок перенес травму.

Процесс распада личности, нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения опережают патологические изменения познавательных процессов – это связано с тем, что у детей и подростков не закреплены социальные нормы поведения.

Наряду с нарушениями интеллектуальной деятельности повышаются инстинктивные влечения (сексуальность, прожорливость), поведение бесцельно и непоследовательно, отсутствует критичность к своему состоянию и, часто, инстинкт самосохранения.

## **Прогрессирующая деменция**

Связана с некоторыми наследственными заболеваниями, которые могут проявиться не с рождения, а намного позже.

В случаях генетически обусловленной деменции, симптомы прогрессируют по мере развития самого заболевания.

Болезнь Ньюмана-Пика, болезнь Лафора, синдром Ретта, лейкодистрофии и другие наследственные заболевания вызывают нейропсихологический дефект прогрессирующего характера.

# Как диагностировать болезнь

- Наблюдение опытного специалиста за развитием ребенка, изучение анамнеза заболевания, сопоставление симптомов, входящих в клинику схожих синдромов;
- Данные биохимического анализа крови;
- Магнитно-резонансная томография.
- Другие виды обследований сосудов головного мозга;
- Генетические исследования;
- Применение ряда психологических тестов.
- Диагностика деменции должна проводиться комплексно.
- Нозологический диагноз может поставить только опытный врач по результатам заключений детского невропатолога, педиатра, психиатра и психолога.

# Профилактические меры

- Терпение по отношению к ребенку, уход и забота;
- Избегание всевозможных ушибов головой, сотрясений головного мозга;
- Оптимальные для состояния больного физические и интеллектуальные нагрузки;
- Стараться избегать инфекционных заболеваний;
- Сбалансированное питание;
- Соблюдение режима дня крайне важно как для физиологического, так и для психологического состояния ребенка;
- Прогулки на свежем воздухе.

*Детская деменция* – тяжелый удар для всей семьи. Прежде всего, родителям нужно постараться найти в себе силы принять тяжелое заболевание ребенка, чтобы потом помочь ему преодолеть все связанные с болезнью проблемы. Несмотря на то, что процесс распада личности необратим, при соблюдении рекомендаций врача, уходе и заботе, можно его замедлить и значительно улучшить качество жизни больного. Не лишним будет и общение с семьями, которые также столкнулись с проблемой.