

*ВІДСТАНЬ МІЖ ДВОМА
ТОЧКАМИ.
КООРДИНАТИ СЕРЕДИНИ
ВІДРІЗКА.*

Рене Декарт



- *Декартову систему координат вперше запропонував відомий французький математик Рене Декарт близько 1637р. у працях «Геометрія» та «Міркування про метод».*
- *Рене́ Дека́рт народився 31 березня 1596 — помер 11 лютого 1650 — французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії.*

«Мислю, - отже, існую».






Рис. 1. Прямокутна система координат на площині

***O – початок координат;
 OX і OY – вісі координат;
 OX – вісь абсцис;
 OY – вісь ординат;
 $A(x;y)$ – координати точки A ,
 x – абсциса, y – ордината.***

***Абсциса – від лат. “абсцисум” -
відрізаний, відсічений.***

***Ордината – від лат. ординатус” -
впорядкований. Від цього кореня
походить і слово “координата.”***

Визначити координати жука і метелика на координатній площині.



*Координатна
площина-це площина,
на якій зображено дві
взаємно
перпендикулярні
координатні прямі.*



Координати точки на площині називають **декартовими**

координатами.

(на честь французького математика Рене Декарта)

II (-; +)

III (-; -)

x – абсциса


y – ордината

A (2; 3)

I (+; +)

B (1; -3)

IV (+; -)




**Побудуйте точки за
вказаними
координатами:**

- **A(1; 2),**
- **B(-1; 0),**
- **C(0; 4),**
- **D(2; -5),**
- **F(-2; 3),**
- **K(-1; -1),**
- **L(4; 0),**
- **M(0; -4),**
- **P(0; 0).**




ВІДСТАНЬ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ



$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Знайдіть відстань між точками:

$C(-1; 2)$ і $B(4; -3)$



Знайдіть відстань між точками:

C(-1; 2) і B(4;-3)

$$CB = \sqrt{(X_B - X_C)^2 + (Y_B - Y_C)^2}$$

$$CB = \sqrt{(4 - (-1))^2 + (-3 - 2)^2} = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{50} \\ = 5\sqrt{2}$$

$$CB = \sqrt{(X_B - X_C)^2 + (Y_B - Y_C)^2}$$

Вершинами трикутника є точки
A(-1;3), B(5;9), C(6;2). Доведіть, що
трикутник-рівнобедрений.

$$AB = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (9 - 3)^2} = \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{(6 - 5)^2 + (2 - 9)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{(6 - (-1))^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{49 + 1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$


BC=AC, ABC-
рівнобедрений.

Координати середини відрізка

$A(x_1; y_1)$

$B(x_2; y_2)$

$C(x; y)$ - середина
відрізка



$$CB = \sqrt{(x_B - x_C)^2 + (y_B - y_C)^2}$$

$$CB = \sqrt{(x_B - x_C)^2 + (y_B - y_C)^2}$$

- $$CB = \sqrt{(X_B - X_C)^2 + (Y_B - Y_C)^2}$$

$$x = \frac{5 + 3}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$y = \frac{4 + 2}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

O(4;3)-середина BC

Задача

Вершини чотирикутника ABCD мають координати $A(-2; 1)$, $B(0; 4)$, $C(4; 1)$, $D(2; -2)$. Доведіть, що ABCD — паралелограм.

Розв'язання (1-й спосіб)

Як відомо, за ознакою паралелограма чотирикутник, діагоналі якого точкою перетину діляться навпіл, є паралелограмом. Знайдемо координати середин діагоналей AC і BD даного чотирикутника ABCD. Середина відрізка AC має координати

$$x = \frac{-2+4}{2} = 1, \quad y = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Середина відрізка BD має координати

$$x = \frac{0+2}{2} = 1, \quad y = \frac{4+(-2)}{2} = 1.$$

Отже, відрізки AC і BD мають спільну середину $(1; 1)$, тобто чотирикутник ABCD — паралелограм за ознакою.

Розв'язання (2-й спосіб)

Як відомо, за ознакою паралелограма чотирикутник, протилежні сторони якого попарно рівні, є паралелограмом. Знайдемо довжини сторін чотирикутника ABCD:

$$AB = \sqrt{(-2-0)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{13}, \quad BC = \sqrt{(0-4)^2 + (4-1)^2} = 5,$$

$$CD = \sqrt{(4-2)^2 + (1-(-2))^2} = \sqrt{13}, \quad AD = \sqrt{(-2-2)^2 + (1-(-2))^2} = 5.$$

Отже, $AB = CD$, $BC = AD$, тобто чотирикутник ABCD — паралелограм за ознакою.