

# **Основы комбинаторики**

# Предмет комбинаторики

**Комбинаторика** – это раздел математики, который изучает задачи выбора и расположения элементов из некоторого множества в соответствии с заданными правилами.

Типичные задачи комбинаторики:

«Сколькими способами можно сделать ... ?», «Сколько вариантов существует ... ?», «Сколькими способами можно выбрать столько-то объектов?» и т.п.

# Предмет комбинаторики

Формулы и принципы комбинаторики используются в теории вероятностей для подсчета вероятности случайных событий и, соответственно, получения законов распределения случайных величин.

Это, в свою очередь, позволяет исследовать закономерности массовых случайных явлений, что является весьма важным для понимания статистических закономерностей.

# Правила комбинаторики

## 1. Правило суммы

Если некоторые  $k$  действий взаимно исключают друг друга, причем первое действие можно выполнить  $n_1$  способами, второе –  $n_2$  способами, третье –  $n_3$  способами и т.д. до  $k$ -го действия, которое можно выполнить  $n_k$  способами, то выполнить одно любое из этих действий можно числом способов, равным:

$$N = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$$

# Правила комбинаторики

## 2. Правило произведения

Пусть требуется выполнить последовательно  $k$  действий. Если первое действие можно выполнить  $n_1$  способами, второе действие –  $n_2$  способами, третье –  $n_3$  способами и т. д. до  $k$ -го действия, которое можно выполнить  $n_k$  способами, то все  $k$  действий могут вместе быть выполнены числом способов, равным:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \cdot n_k$$

# Факториал

**Факториал** – операция произведения всех натуральных чисел от единицы до заданного  $n$  включительно:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n - 1) \cdot n$$

Например:

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 3! \cdot 4 = 24$$

**По определению:**  $0! = 1$

# Свойства факториала

Отношение двух факториалов упрощается следующим образом:

$$\begin{aligned}\frac{(n+m)!}{n!} &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n \cdot (n+1) \cdot \dots \cdot (n+m-1) \cdot (n+m)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n} = \\ &= \frac{\cancel{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n} \cdot (n+1) \cdot \dots \cdot (n+m-1) \cdot (n+m)}{\cancel{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}} = \\ &= (n+1) \cdot \dots \cdot (n+m-1) \cdot (n+m)\end{aligned}$$

# Перестановки без повторений

Число **перестановок** определяет, сколькими способами можно переставить  $n$  элементов множества.

Если элементы множества можно считать различными, то применяется формула подсчета числа **перестановок без повторений**:

$$P_n = n!$$



# Перестановки с повторениями

Если в рассматриваемом множестве присутствуют одинаковые элементы, причем элементов первого типа  $n_1$  штук, элементов второго –  $n_2$  штук, третьего –  $n_3$  и т.д. до  $k$ -го типа элементов, общее число которых равно  $n_k$ , то применяется формула подсчета числа **перестановок с повторениями**:

$$\bar{P}_n = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!\dots n_k!}$$

# Сочетания без повторений

Число **сочетаний** определяет, сколькими способами можно выбрать  $m$  элементов из множества, состоящего из  $n$  элементов.

Если элементы множества можно считать различными, то применяется формула подсчета числа **сочетаний без повторений**:

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

# Сочетания с повторениями

Если в множестве присутствуют одинаковые элементы, причем число различных типов элементов равно  $n$ , и из них требуется выбрать  $m$  элементов (причем все  $m$  элементов могут быть одного типа), то применяется формула подсчета числа **сочетаний с повторениями**:

$$\overline{C}_n^m = \frac{(n + m - 1)!}{(n - 1)!m!} = C_{n+m-1}^m$$

# Размещения без повторений

Число **размещений** определяет, сколькими способами можно выбрать  $m$  элементов из множества, состоящего из  $n$  элементов, и в каждой выборке переставить их местами. Если элементы множества можно считать различными, то применяется формула подсчета числа **размещений без повторений**:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = C_n^m \cdot P_m$$

# Размещения с повторениями

Если каждый из  $n$  элементов множества можно выбирать неоднократно, то применяется формула подсчета числа **размещений с повторениями**:

$$\overline{A}_n^m = n^m$$

# Выбор формулы комбинаторики

