



## Лекция

Ю.С. Кармановой, заместителя директора по  
медицинской части

«Вологодского психоневрологического интерната №1»  
2021г.



**Медицинские противопоказания к  
проведению профилактической  
вакцинации против новой коронавирусной  
инфекции COVID - 19**

Министерством здравоохранения Российской Федерации,  
Федеральным государственным бюджетным учреждением  
«Национальный медицинский исследовательский центр  
терапии и профилактической медицины» министерства  
здравоохранения Российской Федерации

Утверждены временные методические  
рекомендации «Порядок проведения  
вакцинации взрослого населения против  
COVID-19» (Москва 2021г.)

Методические рекомендации содержат **требования** к проведению вакцинации против COVID – 19 взрослого населения, направленные на обеспечение **эффективности и безопасности** вакцинации.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID – 19 не может стать заболевание COVID – 19, равно как положительный результат ПЦР – теста или лабораторного теста на антиген.

Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а **создает иммунный ответ.**

- До достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения), необходимо проводить вакцинацию **спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания или спустя 6 месяцев после предыдущей вакцинации.**
- Вакцинация против COVID – 19 проводится **без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.** (Аналогичной позиции придерживается ВОЗ). В настоящий момент не существует утвержденного определенного защитного уровня антител, который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин.
- Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить **любой вакциной,** зарегистрированной в установленном порядке.

## Медицинские противопоказания к проведению профилактической вакцинации против COVID - 19

- Использование для массовой иммунизации современных высокоэффективных вакцин против COVID- 19 сопряжено с **низкой частотой тяжелых реакций и осложнений,** возникающих в поствакционном периоде. Основная их часть носит характер индивидуальных реакций. В поствакцинальном периоде в первые – вторые сутки **могут** развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией (боли в суставах), миалгией (боли в мышцах), астенией, общим недомоганием, головной болью и местные (болезненность в месте инъекции, гиперэмия (покраснение), отечность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия (нарушение стула), снижение аппетита, иногда увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

## Медицинские противопоказания к проведению профилактической вакцинации против COVID - 19

- Несоблюдение противопоказаний, необоснованные медицинские отводы от прививок приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергическими заболеваниями и сердечно - сосудистыми заболеваниями оказываются беззащитными перед COVID - 19, КОТОРАЯ У НИХ ПРОТЕКАЕТ ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО!

## Медицинские противопоказания к проведению профилактической вакцинации против COVID - 19

ВАКЦИНА	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	СРОКИ МЕДИЦИНСКОГО ОТВОДА
Гам - КОВИД - Вак	Гиперчувствительность (повышенная чувствительность) к какому - либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты	Постоянные
	Тяжелые аллергические реакции в анамнезе	Постоянные
	Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - <u>вакцинацию проводят через 2-4 недели</u> после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКК - вакцинацию проводят <u>после нормализации температуры</u>	Временные
	Период грудного вскармливания	Постоянные
	Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)	Постоянные
	<u>Противопоказания для введения компонента II</u> • <u>Тяжелые</u> поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40...) на введение компонента I вакцины	Постоянные



## Медицинские противопоказания к проведению профилактической вакцинации против COVID - 19



ВАКЦИНА	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	СРОКИ МЕДИЦИНСКОГО ОТВОДА
Спутник Лайт	Гиперчувствительность (повышенная чувствительность) к какому – либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты	Постоянные
	Тяжелые аллергические реакции в анамнезе	Постоянные
	Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – <u>вакцинацию проводят через 2-4 недели</u> после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКК – вакцинацию проводят <u>после нормализации температуры</u>	Временные
	Беременность и период грудного вскармливания	Постоянные
	Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)	Постоянные

## Медицинские противопоказания к проведению профилактической вакцинации против COVID - 19

ВАКЦИНА	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	СРОКИ МЕДИЦИНСКОГО ОТВОДА
ЭпиВакКорона	Гиперчувствительность (повышенная чувствительность) к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим)	Постоянные
	Тяжелые формы аллергических заболеваний	Постоянные
	Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины	Постоянные
	Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания <u>в стадии обострения</u> – <u>прививки проводят не ранее чем через месяц</u> после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКК – вакцинацию проводят <u>после нормализации температуры</u>	Временные
	Иммунодефицит (первичный) (врожденные заболевания вследствие генетических нарушений)	Постоянные
	Злокачественные заболевания крови и новообразования	Постоянные
	Беременность и период грудного вскармливания	Постоянные
	Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)	Постоянные

## Медицинские противопоказания к проведению профилактической вакцинации против COVID - 19

ВАКЦИНА	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	СРОКИ МЕДИЦИНСКОГО ОТВОДА
КовиВак	<p>Серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40, гиперемия (покраснение) или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс (резкое снижение АД с потерей сознания) или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе</p>	Постоянные
	<p>Отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке (затруднение дыхания), полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких – либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.)</p>	Постоянные
	<p>Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины</p>	Постоянные
	<p>Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции (выздоровления). Вакцинацию проводят <u>через 2-4 недели</u> после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях - <u>после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.</u></p>	Временные
	<p>Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения</p>	Временные
	<p>Беременность и период грудного вскармливания</p>	Постоянные
	<p>Возраст до 18 лет</p>	Постоянные

- При наличии постоянных или временных противопоказаний пациенту выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против COVID - 19 на определенный период.
- Наличие мед. противопоказаний к проведению вакцинации определяется лечащим врачом или врачом той специальности, который определяет противопоказания против вакцинации.
- РЕШЕНИЕ о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимает ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ той мед. организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющимся медицинским отводом.
- В случае определения временных противопоказаний от вакцинации справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку.
- В справке о наличии медицинского отвода должны быть отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинский отвод), срок действия медицинской справки, место для предоставления справки.



**Спасибо за внимание!**