



# Щеплення

Підготувала вчитель початкових класів  
Смілянської спеціалізованої школи I-III  
ступенів №12  
Сидяка Наталія Миколаївна

**Вакцинація** — введення антигенного матеріалу з метою породити імунітет до хвороби, який запобігає зараженню або ослабляє його негативні наслідки.







**Щеплення** - це введення в організм ослаблених або зруйнованих збудників захворювання.

# КІР В УКРАЇНІ:


## що потрібно знати

### Групи ризику:

-  діти 2-5 років
-  підлітки
-  нещеплені дорослі

 Кір передається **через повітря під час розмови або чхання**

 Інкубаційний період – **6-21 день**


 Вірус живе у повітрі та на поверхнях **до 2 год**


### Симптоми кору:


-  висока температура
-  головний біль
-  нежить
-  сухий кашель
-  збільшення лімфовузлів
-  запалення очей
-  розлад шлунку
-  червоний висип на тілі

# ЛІКУВАННЯ:

 Ліків від кору **не існує!**

 Якщо у вас немає щеплення, обов'язково зробіть його впродовж **72 год** після контакту із хворим

 Ефективний спосіб профілактики – **вакцинація**

 Планове щеплення роблять у віці **1 та 6 років**



# ГРИП: ЧОМУ КРАЩЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ



## ЛІКУВАННЯ

- грип може мати ускладнення
- витрати на лікування грипу чи ГРВІ коливаються від 420 до 2800 грн у залежності від тяжкості захворювання



## ВАКЦИНАЦІЯ

- збереже здоров'я
- заощадить кошти:  
1 доза вакцини, що захищає від грипу упродовж усього сезону, складає близько 200-300 гривень

# Гепатит А



**Гепатит А** ("хвороба Боткіна", жовтуха) — гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки.

## Причина захворювання:



Немиті руки



Близький контакт з хворим



Погано оброблена їжа



Спільний посуд

## Симптоми:

Час між інфікуванням та появою симптомів складає від **2** до **6** тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони зберігаються протягом **1-4** тижнів.



- гарячка (перші 3 дні хвороби);



- слабкість;



- зниження апетиту;



- жовтяниця (жовтіє шкіра і навіть очі, темніє сеча, кал знебарвлюється);



- блювання та біль у животі;



- гостра печінкова недостатність (рідко).

## Профілактика:

Найефективнішим способом попередження гепатиту А є **вакцинація**.

**ЩОРОКУ ЗАВДЯКИ  
ВАКЦИНАЦІЇ У СВІТІ  
ВДАЄТЬСЯ ЗБЕРЕГТИ  
2-3 МЛН ДИТЯЧИХ  
ЖИТТІВ**

