


ТУБЕРКУЛЕЗ

Выполнила Арсланова Альбина
группа 403 ф/л



Туберкулёз— широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий,


как правило, **Mycobacterium**

tuberculosis (палочка Коха). Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. **Mycobacterium tuberculosis** передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного^[2]. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме (тубинфицированность),


скрыт



Классические симптомы туберкулёза лёгких — длительный кашель с мокрой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, лихорадка, слабость, ночная потливость и значительное похудение.





- Различают открытую и закрытую формы туберкулёза. При открытой форме в мокроте или в других естественных выделениях больного (моча, свищевое отделяемое, редко — кал) обнаруживаются микобактерии туберкулёза.



- При «закрытой» форме туберкулёза микобактерии в мокроте доступными методами не обнаруживаются, больные такой формой эпидемиологически не опасны или мало опасны для окружающих.

3,
9
3




Инфильтративный туберкулез легких




18 — 26 лет.


й
к
а



• Возбудителями туберкулёза являются микобактерии — кислотоустойчивые бактерии рода *Mycobacterium*. Всего известно 74 вида микобактерий. Они широко распространены в почве, воде, среди людей и животных. Однако туберкулёз у человека вызывает условно выделенный комплекс, включающий в себя *Mycobacterium tuberculosis* (человеческий вид), *Mycobacterium bovis* (бычий вид), *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium bovis BCG* (БЦЖ-штамм бычьего вида), *Mycobacterium microti*, *Mycobacterium canettii*. В последнее время к нему отнесены *Mycobacterium pinnipedii*, *Mycobacterium caprae*, филогенетически имеющие отношение к *Mycobacterium microti* и *Mycobacterium bovis*.




Source: W
Fitzpatrick
Copyright




В пораженных туберкулёзом органах (лёгкие, мочеполовая система, лимфатические узлы, кожа, кости, кишечник и др.) развивается специфическое «холодное» туберкулёзное воспаление, носящее преимущественно гранулематозный характер и приводящее к образованию множественных бугорков со склонностью к распаду.

енные "подсветили" возбудителя
туберкулеза.



Г
У
Т
М
А
М
Б
Р
А
Д
В
Д
Б



• Основной профилактикой туберкулёза на сегодняшний день является вакцина **БЦЖ (BCG)**. В соответствии с «**Национальным календарём профилактических прививок**» прививку делают в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3—7 дней жизни ребенка. В 7 и 14 лет в отсутствие противопоказаний проводят ревакцинацию.



• С целью выявления туберкулеза необходимо проходить **флюорографию** (в зависимости от профессии и группы риска). Также при ревакцинации («вираже»), **фтизиатром** может быть предложено провести профилактическую химиотерапию несколькими препаратами, как правило, в комплексе с **гепатопротекторами** и **витаминами группы В**.



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!!!