


Простейшие — Protozoa



Простейшие — Protozoa

- (от греч. proto — начало, zoa — животное), микроскопические одноклеточные животные.
- Многие из них — возбудители тяжелых заболеваний человека и животных. Размеры простейших сильно варьируют: величина малярийного плазмодия 2—5 мкм, а балантидия 60—80 мкм.
- Структура клетки простейшего сходна со структурой клетки всех животных. Простейшие покрыты мягкой, гибкой и хрупкой внешней оболочкой — плазмолеммой, по структуре сходной с цитоплазматической мембраной бактерий.
-

Строение

- Простейшие покрыты мягкой, гибкой и хрупкой внешней оболочкой — плазмолеммой, по структуре сходной с цитоплазматической мембраной бактерий.
- В цитоплазме имеется развитая эндоплазматическая сеть, которая делит ее на отсеки.
- Мембраны этой сети участвуют в образовании различных структур и органелл клетки, таких, как ядро, лизосомы, митохондрии, диктиосомы или тельца Гольджи, различные вакуоли (пищеварительные, сократительные).

Ядро

- простейших, чаще одиночное, содержит основное количество ДНК.
- окружено оболочкой, состоящей из двух элементарных мембран.
- в ядерной оболочке имеются поры размером до 10 нм.

Лизосомы

- — сферические структуры диаметром около 0,5 мкм, окруженные мембраной. Они содержат ряд гидролитических ферментов и участвуют в процессах переваривания различных веществ.

Митохондрии

- являются фабриками клеточного дыхания.
- В митохондриях имеются ферменты, которые участвуют в процессах биологического окисления, обеспечивая клетку энергией. В митохондриях обнаружена ДНК.

Классификация

- Тип простейших — Protozoa — делится на 4 класса:
- Sarcodina,
- Flagellata,
- Sporozoa,
- Ciliata.

Среди них имеются возбудители заболеваний — патогенные простейшие.

Саркодовые

- **Класс Sarcodina (саркодовые).**
Представители этого класса — амебы — передвигаются с помощью псевдоподий, или ложноножек, и представляют собой кусочек цитоплазмы, покрытый очень тонкой и податливой оболочкой

Амебы

- Цитоплазма амебы состоит из более плотного наружного слоя —эктоплазмы и внутренней эндоплазмы.
- В цитоплазме расположены ядро с ядрышком внутри, пищеварительные и выделительные вакуоли, гранулы запасных питательных веществ. В неблагоприятных условиях амебы образуют цисты, очень устойчивые к вредным воздействиям.
- Амебы размножаются делением.
Дизентерийная амеба (*Entamoeba histolytica*) вызывает у человека амебную дизентерию, или амебиаз.

Жгутиковые

- Класс Flagellata (жгутиковые).
- передвигаются при помощи одного или нескольких жгутиков. Размеры их составляют 150— 300 нм в диаметре и 20—2000 мкм в длину.
- Внутри жгутика находится кольцо из 9 фибрилл диаметром 20—40 нм, непосредственно связанных с базальной гранулой.
- В организме человека паразитируют различные виды жгутиковых.

Трихомонады.

- В организме человека обитают кишечные и влагалищные трихомонады .
- Патогенность ротовой трихомонады не установлена. Большое количество трихомонад в ротовой полости свидетельствует о плохом гигиеническом состоянии ее.
- Влагалищная трихомонада вызывает заболевания женских половых органов.
- Роль кишечной трихомонады в развитии кишечных заболеваний не установлена.

Лямблии

- **находятся у человека в двенадцатиперстной кишке и при большом количестве могут нарушать процесс всасывания питательных веществ слизистой оболочкой кишечника.**

Лейшмании

- **вызывают тяжелые заболевания человека: висцеральный и кожный лейшманиоз. В организме человека они образуют мелкие овальные лейшманиальные формы, в цитоплазме которых содержатся ядро, кинетопласт и остатки жгутика.**
- **В организме переносчика — москита-флеботомуса и при выращивании на искусственных питательных средах лейшмании образуют лептомонадные формы: подвижные, с вытянутым телом и жгутиком на переднем конце.**

Трипаносоми

- **вызывают тяжелые заболевания человека: сонную болезнь в Африке и болезнь Чагаса в Южной Америке. Имеют крупное веретенообразное тело и кинетопласт в заднем конце его. Вдоль всей поверхности тела проходит волнообразная, или ундулирующая, мембрана, заканчивающаяся жгутиком на переднем конце.**

Реснитчатые

- **Класс Ciliata (реснитчатые). Типичным представителем его является *Balantidium coli*, вызывающий у человека балантидиаз. Имеет овальную форму, покрыт упругой твердой хитиновой оболочкой. Активно передвигается с помощью ресничек, покрывающих все тело балантидия.**

Реснитчатые

- На одном конце находится рот, ведущий в «глотку» типа воронки, куда пища заносится ресничками, расположенными вокруг рта. Процесс пищеварения происходит в пищеварительных вакуолях.
- Балантидии размножаются бесполом путем (простое деление) и половым — конъюгацией В неблагоприятных условиях балантидии образуют цисты.

Споровики

- **Класс Sporozoa (споровики). Наиболее известными представителями этого класса являются возбудители малярии — плазмодии. У человека паразитируют 4 вида плазмодиев: *Plasmodium vivax*, *Pl. malariae*, *Pl. falciparum*, *Pl. ovale*.**
- **к классу споровиков отнесены токсоплазмы, вызывающие заболевание человека и животных — токсоплазмоз.**




Рис. 17. Морфология простейших.
 1-5 — дизентерийная амеба; 6-8 — кишечная амеба; 9-11 — трихомонады человека; 12, 13 — жгутики; 14, 15 — балантидии

