Нарушенная внематочная беременнос

Определить общее состояние больной и степень кровопотери.

Стадия перитонеального шока (разрыв трубы):
1) внезапные интенсивные боли в нижней части живота
2) иррадиация болей в эпигастральную область (ЖП, желудок)
3) чувство давления на прямую кишку
4) тошнота, твота
5) френикус-симптом
6) частый слабый пульс, падение АД
7) перитонеальные симптомы в нижней части живота

Уточнить гинекологический и акушерский анамнез

Факторы риска:
1) перенесенные ранее аднексит, эндомиометрит, аборты
2) нарушение гормональной функции яичников
3) генитальный инфантилизм
4) эндометриоз
5) перенесенные операции на внутренних половых органах

Провести дифференциальную диагностику

1) Острое воспаление придатков матки
2) Нарушение питания миоматозного узла
3) перекрут ножки опухоли яичника
4) острый аппендицит
5) острый холицистит
6) почечная колика
7) другие острые хир. заболевания

Срочная госпитализация

Инфузионная терапия
1) 400мл полиоксидина или 400мл полиглюкина в.в.
2) 400мл реополиглюкина в. в.
3) 500мл 5% р-ра глюкозы и 3мл 5% р-ра аскорбиновой

Терапия глюкокорт икоидами по

Ингаляция кислорода и воздуха через аппарат КИ-3М или пневмокомп