

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»

# Красная книга самарской области

---

Подготовила студентка  
группы С-101  
Свиридова Е.В.  
Руководитель:  
Загуменнова Е.М

# Дыбка степная

Дыбка степная является крупнейшим видом исчезающих кузнечиков на территории России. Этого представителя уже практически не встретишь в его привычном ареале обитания. Обитает степная дыбка на территории поросших полынью степях, на склонах и холмах, в низменных местностях с богатой растительностью и злаками.





# Волжский подуст

Волжский подуст (лат. *Chondrostoma variable*) — рыба семейства карповых.

Рыба средних размеров длиной до 35 см и массой тела до 1,6 (обычно 0,4) кг. Продолжительность жизни — до 8 лет. Тело невысокое, удлинённое, несколько утолщённое, рот нижний, имеет вид поперечной щели, нижняя челюсть заострённая, покрытая роговым чехликом. Чешуя циклоидная, крупная, на боковой линии 50—62 чешуи. В брачный период у самцов голова покрывается роговыми бугорками.





# Тритон гребенчатый

**Гребенчатый тритон** (лат. *Triturus cristatus*) относится к семейству Саламандровые (*Salamandridae*). Его отличительной особенностью является наличие гребня высотой до 15 мм, появляющегося у самцов в сезон размножения. Это хвостатое земноводное часто содержится в частных коллекциях. В естественных условиях его популяция с середины прошлого века неуклонно сокращается.





# Черепаша болотная

Болотная черепаха — активный, преследующий добычу, хищник. В отличие от средиземноморской, она питается самой разнообразной пищей. На берегу рептилия ловит насекомых (чаще всего прямокрылых), многоножек; в воде, кроме водных беспозвоночных, охотится на головастиков, тритонов, лягушек, реже – на рыбу



(здоровую и крупную рыбу черепахе поймать трудно, обычно она вылавливает больную, выполняя попутно роль санитара водоема).

# Коршун чёрный

Можно сказать, что эта хищная птица вездесуща и покорила весь земной шар – кроме, наверное, полярных областей. Естественно, что при такой широте ареала образовалось несколько подвидов.

Места обитания чёрных коршунов – различные леса и заливные луга; обычно на территории проживания находятся водоёмы. Случается, что они залетают в деревни и города. Хотя в полёте коршун кажется крупным, на деле он не так уж и велик: в длину 40-60 см, а весит от 800 до 1 200 гр. То есть по размерам и весу он уступает воронам вида *corvus corax*. Но крылья у него большие, почти как всё тело – 40-55 см, а их размах может превышать полтора метра.





# Ушастый ёж

Ушастый ёж (от латинского *Nemioechinus*) – это один из родов млекопитающих из большого семейства ежевых. Отличаются они от других представителей своего семейства выпирающими длинными, заостренными к кончику ушами.





# Лук голубой

Голубой лук – это травянистый многолетник со съедобными луковицами. Трехгранные длинные листья имеют приятный вкус и слабый чесночный аромат. На одном растении находится 3-4 листика длиной до 40 см, собранных в прикорневую розетку. После активного развития в весенний период листья голубого лука начинают отмирать, а осенью на их месте появляются молодые листочки.





# Кукушкин лён обыкновенный

В России встречается в северной и средней полосе, преимущественно в лесных районах. Растёт в сырых заболачиваемых таёжных лесах-долгомошниках, на мокрых лугах и болотах. Формирует подушкообразные дерновины, способствующие поверхностному удержанию воды и заболачиванию территорий.





# Хвощ ветвистый


- Маленький и незаметный корневищный многолетник с узкими ребристыми и ветвистыми или не ветвистыми стеблями. Растёт на песчаных, глинистых и каменистых обнажениях, прибрежных обрывах, сухих лугах, пастбищах. Среди хвощей наименее влаголюбив.





# Фиолетовый паутинник

- Паутинник фиолетовый – гриб пластинчатый, и эти пластинки у него тоже темно-фиолетового цвета. Споры же, на них образующиеся – ржаво-бурые. Мякоть гриба бело-голубоватая, голубая или фиолетовая.







***Спасибо за внимание!***