

Первая медицинская помощь при гипер- и гипогликемической коме

Подготовил студент 32 группы
Пашнев Станислав

Гипогликемическая кома

Гипогликемическая кома — остро возникающее патологическое состояние, проявляющееся реакцией нервной системы в определённой последовательности, связанное с падением или резким перепадом уровня гликемии (концентрации углеводов в плазме крови).



ГИПОГЛИКЕМИЯ

Симптомы гипогликемии



дрожь



потливость



состояние патологического страха



головокружение



чувство голода



сердцебиение



ослабление зрения



слабость
утомляемость



головная боль



раздражительность

ПРИЧИНЫ ГИПОГЛИКЕМИИ

Избыточная физическая нагрузка




Нарушение режима питания



Алкоголь



Слишком много медикаментов



Сильная перегрузка в спорте



Некоторые лекарства

Первая медицинская помощь

Инсулиновый шок

Как распознать?



Помутнение сознания и драчливость, головокружение, обильное потение, быстрый слабый пульс, холодная потная кожа, судороги

Что делать?



1

Вызвать врача



2

Сделать инъекцию (если есть поблизости глюкагон и вы знаете, как его применять)



3

Дать больному конфету или сахар в чистом виде, мед, крем для торта, фруктовый сок или воду с разведенным в ней сахаром (три столовые ложки на стакан)


Гипергликемическая кома

Гипергликемическая кома является наиболее тяжелым и опасным для жизни человека осложнением сахарного диабета. Развивается она в результате нарастания инсулиновой недостаточности и значительного снижения утилизации глюкозы в крови.



ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

Симптомы гипергликемии



Частое мочеиспускание



Кожный зуд



Чувство голода



Сильная жажда



Неясность зрения



Сонливость



Тошнота

Причины развития гипергликемической комы

- Несвоевременно выявленный сахарный диабет
- Неправильное лечение сахарного диабета
- Нарушение диеты при сахарном диабете
- Отказ от применения инсулина
- Травмы и инфекционные заболевания



Первая помощь при гипергликемической коме

Диабетическая кома

Как распознать?



У больного появляются расстройство сознания и дезориентация (состояние иногда принимают за опьянение), сонливость, сильная жажда, учащенное затрудненное дыхание, горячая сухая кожа

Что делать?



1

Вызвать врача



2

Если человек без сознания, не дышит и его пульс не прощупывается – приступить к непрямому массажу сердца




3

Если пульс есть и больной дышит, обеспечить ему доступ воздуха, положить на левый бок

4



Человеку в сознании – дать еду или питье, содержащие сахар

 Ни в коем случае не пытайтесь давать человеку без сознания что-либо есть или пить!

АРО
ИФК