

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И  
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

# Лекция 3

# Формула классической вероятности

$$P(A), \text{ где } \frac{m}{n}$$

$m$  – число элементарных исходов, благоприятствующих  $A$ ;

$n$  – число всех возможных элементарных исходов испытания.

Элементарные исходы **несовместны**, **равновозможны** и **образуют полную группу**.

# Свойства вероятности

*Свойство 1. Вероятность достоверного события равна единице.*

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

**Свойство 2. Вероятность  
невозможного события равна нулю.**

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{0}{n} = 0$$

**Свойство 3. Вероятность случайного события  $A$  есть число, заключенное между нулем и единицей.**

$$0 \leq P(A) = \frac{m}{n} \leq 1.$$

# Требования к классической схеме

- 1) Выбрать множество элементарных исходов
- 2) Подсчитать число всех элементарных исходов
- 3) Если вычисляем  $P(A)$ , подсчитать число благоприятных исходов.

# Пример 1

Монету подбрасывают дважды.  
Построить множество  
элементарных исходов.



# Решение

- Если учитывать порядок, то исходов получится четыре  
(герб,герб) (решка,решка) (герб,решка)  
(решка,герб)  
Все эти исходы равновозможны.

- Если порядок не учитывать, то исходы (решка, герб) и (герб, решка) считают как один. Тогда элементарных исходов будет три

(герб, герб) (решка, решка) (герб, решка)

# Гипергеометрическая формула

В случае разбиения исходного множества на два подмножества

$$P(A) = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

$$P(A) = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

- $N$  – общее количество элементов
- $M$  – количество элементов определенного типа
- $n$  – отобранные
- $m$  – количество элементов в выборке, связанных с  $M$

## Пример 1

В фирме работают 6 женщин и 4 мужчин. Наудачу отобраны 7 человек. Чему равна вероятность, что среди отобранных ровно 3 женщины?

**Решение:** Имеем  $N=10$ ;  $n=7$ ;  $M=6$ ;  $m=3$ .  
Тогда

$$P(A) = \frac{C_6^3 C_4^4}{C_{10}^7} = \frac{1}{6}$$

## Пример 2

В партии из 6 деталей 3 стандартных.  
Найти вероятность того, что среди  
четырех взятых наудачу деталей 2  
стандартных.

**Решение:** Имеем  $N=6$ ;  $n=4$ ;  $M=3$ ;  
 $m=2$ .

Тогда

$$P(A) = \frac{C_3^2 C_3^2}{C_6^4} = \frac{3}{5}$$

# Покерные комбинации

- Пара(2) : Т  ; 10  ; К  ; 2  ; 2 
- Две пары:(2+2) 10  ; 10  ; К  ; 2  ; 2 
- Тройка(3): Т  ; 10  ; 2  ; 2  ; 2 
- Стрит(Street): Т  ; 10  ; К  ; Д  ; В 
- Флеш(Flush): Т  ; 10  ; К  ; 2  ; 2 
- 3+2: 10  ; 10  ; 2  ; 2  ; 2 
- Каре: 10  ; 2  ; 2  ; 2  ; 2 
- S+F: Т  ; 10  ; К  ; Д  ; В  .



# Расчет вероятностей покерных комбинаций

Результат эксперимента – наименования пяти карт, например, (Т♠; 10♣; К♣; 2♦; 2♠).

Число всех исходов

$$n = C_{52}^5 = 2\,598\,960$$

# Вероятность пары

- Число благоприятных исходов и вероятность пары

$$m = C_{13}^1 \cdot C_4^2 \cdot C_{12}^3 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1 = 1098240$$

$$P(\text{"2"}) = \frac{m}{n} = 0,4225690276$$

# Вероятность двух пар

- Число благоприятных исходов и вероятность двух пар

$$m = C_{13}^2 \cdot C_4^2 \cdot C_4^2 \cdot C_{11}^1 \cdot C_4^1 = 494208$$

$$P("2 + 2") = \frac{m}{n} = 0,1901560624$$

$$P("3") = \frac{C_{13}^1 \cdot C_4^3 \cdot C_{12}^2 \cdot C_4^1 \cdot \tilde{N}_4^1}{2598960} = \frac{54912}{2598960} = 0,0211284514$$

$$P("S") = \frac{9 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1 \cdot \tilde{N}_4^1 \cdot C_4^1}{2598960} = \frac{9216}{2598960} = 0,0035460338$$

$$P("F") = \frac{C_{13}^5 \cdot \tilde{N}_4^1}{2598960} = \frac{5148}{2598960} = 0,0019807923$$

$$P("3 + 2") = \frac{C_{13}^1 \cdot C_4^3 \cdot C_{12}^1 \cdot C_4^2}{2598960} = \frac{3744}{2598960} = 0,0014405762$$

$$P("K") = \frac{C_{13}^1 \cdot \tilde{N}_{12}^1 \cdot C_4^1}{2598960} = \frac{624}{2598960} = 0,0002400960$$

$$P("S + F") = \frac{9 \cdot 4}{2598960} = \frac{36}{2598960} = 0,0000138517$$

# Относительная частота

*Относительной частотой* события называют отношение числа испытаний, в которых событие появилось, к общему числу фактически произведенных испытаний.

$$W(A) = \frac{m}{n}$$

где  $m$  – число появлений события,  
 $n$  – общее число испытаний.

## Пример

По цели произвели 32 выстрела, причем было зарегистрировано 15 попаданий. Чему равна относительная частота поражения цели?

**Решение:** общее число испытаний  $n=32$ .

Событие появилось 15 раз, то есть  $m=15$ . Тогда  $W(A)=15/32$ .

# Статистическая вероятность появления события

Относительная частота –  
приближенное значение  
вероятности, называемое  
статистической.

# Пример



По данным статистики, относительная частота рождения девочек за некоторый год по месяцам характеризуется следующими числами (начиная с января):

0,486; 0,489; 0,490; 0,471; 0,478; 0,482;  
0,462; 0,484; 0,485; 0,491; 0,482; 0,473.



Относительная частота  
колеблется около числа 0,482,  
которое можно принять за  
*приближенное значение*  
*вероятности рождения девочек.*

# Проверка свойств статистической вероятности

1. Если событие достоверно, то  $m = n$  и относительная частота

$$\frac{m}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

2. Если событие невозможно, то  $m = 0$  и, следовательно, относительная частота

$$\frac{0}{n} = 0$$

Для любого события  $0 \leq m \leq n$   
следовательно, относительная  
частота

$$0 \leq \frac{m}{n} \leq 1$$

т.е. *статистическая вероятность*  
*любого события заключена между*  
*нулем и единицей.*

# Операции над событиями

# Сумма событий

Пусть даны события  $A$  и  $B$ .

**Сумма** событий  $A+B$  – событие, которое означает, что произошло хотя бы одно из исходных событий.

# Разность событий

Разностью двух событий  $A$ - $B$  называется событие, состоящее в том, что  $A$  произошло, но  $B$  не произошло

# Произведение событий

Пусть даны события  $A$  и  $B$ .

**Произведение** событий  $AB$  – событие, которое означает, что одновременно произошли оба события.

# Противоположные события

$A$  и  $\bar{A}$

События называются **противоположными**, если они несовместны и образуют полную группу.

$$p(A) + p(\bar{A}) = 1$$



Другими словами:

Событием, противоположным к  $A$ , называется событие  $\bar{A}$ , состоящее в том, что событие  $A$  не произошло.

# Примеры

$A = \{\text{идет дождь}\}$

$B = \{\text{идет снег}\}$

$AB = \{\text{идет дождь и снег}\}$

$A+B = \{\text{идет дождь или снег}\}$

# Пример противоположного события

$A$  = {попадание в мишень}

$\bar{A}$  = {промах}

# Задача 1

Вероятность того, что день будет ясным равна 0,3. Чему равна вероятность, что день будет дождливым?

**Решение.**  $A$  = {день ясный}

$\bar{A}$  = {день дождливый}

Так как сумма противоположных событий равна 1, то вероятность, что день будет дождливым равна  $1 - 0,3 = 0,7$ .

## Задача 2

Вероятность не сдать зачет по предмету для некоторого студента равна 0,8. Какова вероятность сдать зачет?

# Решение

- Обозначим событие  $A = \{\text{сдать зачет}\}$ . Тогда противоположным событием будет событие  $\bar{A} = \{\text{не сдать зачет}\}$ .
- Так как  $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ , то  $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- Вероятность  $P(A) = 1 - 0,8 = 0,2$

# Вероятностное пространство

Пусть в результате испытания  
наступает одно и только одно из  
совокупности событий, называемых  
*элементарными событиями*  
*(элементарными исходами):*

$$\omega_i, (i = 1, 2, \dots, n, \dots)$$



Множество всех элементарных событий, которые могут появиться в испытании, называют **пространством элементарных событий** ,  $\Omega$

а сами элементарные события – **точками пространства** .  $\Omega$

# Пример

В урне 4 шара: красный, синий, желтый, зеленый. Наудачу вынимают один шар.

Выпишем множество элементарных исходов

$\omega_1$  - вынули красный шар

$\omega_2$  - вынули синий шар

$\omega_3$  - вынули желтый шар

$\omega_4$  - вынули зеленый шар

- Пространство

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$$

- Точки этого пространства

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$$

# Поле событий $S$

- Поле событий – подмножество множества всех подмножеств  $\Omega$ , замкнутое относительно операций объединения, пересечения, дополнения, содержащее само  $\Omega$  и пустое подмножество.

# Аксиомы вероятностного пространства:

1. Каждому событию  $A$  поставлено в соответствие неотрицательное действительное число  $P(A)$ . Это число называется вероятностью события  $A$ ;
2. Вероятность достоверного события равна единице:  $P(\Omega) = 1$
3. Вероятность наступления суммы попарно несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий.

# Вероятностное пространство

$$\langle \Omega, \mathcal{S}, p \rangle$$

# Типы пространств

Выделяют два основных типа:

- Дискретное вероятностное пространство;
- Непрерывное вероятностное пространство.

# Дискретное вероятностное пространство

- Конечное –
  - классическая схема;
  - неклассическая.
- Бесконечное.




# Непрерывное пространство

- **Пример.**

Случайный эксперимент – измерение роста человека. Случайное событие – произвольное положительное действительное число.

# Геометрические вероятности

*Геометрические вероятности* –  
вероятности попадания точки в  
область (отрезок, часть плоскости и  
т.д.).



Пусть отрезок  $l$  -  
часть отрезка  $L$ .  
На отрезок  $L$  наудачу  
поставлена точка.


Это означает выполнение следующих  
предположений:

- поставленная точка может оказаться  
в любой точке отрезка  $L$ ,
- вероятность попадания точки на  
отрезок  $l$  пропорциональна длине  
этого отрезка и не зависит от его  
расположения относительно отрезка  
 $L$ .

Вероятность попадания точки  
на отрезок  $l$  определяется  
равенством

$$P = \frac{\text{Длина } l}{\text{Длина } L}$$

## Пример 1




На отрезок  $OA$   
длины  $L$   
числовой оси  $Ox$   
наудачу  
поставлена точка  
 $B(x)$ .


Найти вероятность того, что меньший  
из отрезков  $OB$  и  $BA$  имеет длину,  
большую  $\frac{L}{3}$ .

## Решение.

Разобьем  
отрезок  $OA$   
точками  $C$  и  $D$   
на 3 равных  
части.



Требование задачи будет выполнено,  
если точка  $B(x)$  попадет  
на отрезок  $CD$  длины  $\frac{L}{3}$ .



Искомая  
вероятность:

$$P = \frac{L/3}{L} = \frac{1}{3}.$$




Пусть плоская  
фигура **g**  
составляет часть  
плоской фигуры **G**.

На фигуру **G** наудачу брошена точка.



*Вероятность попадания точки в фигуру*  
***g*** определяется равенством:

$$P = \frac{\text{Площадь } g}{\text{Площадь } G}$$



## *Пример 2*

На плоскости начерчены две концентрические окружности, радиусы

которых 5 и 10 см соответственно.

Найти вероятность того, что точка, брошенная наудачу в большой круг, попадет в кольцо, образованное построенными окружностями.

**Решение.**

Площадь кольца (фигуры **g**):

$$S_g = \pi 10^2 - \pi 5^2 = 75\pi$$

Площадь большого круга  
(фигуры **G**):

$$S_G = \pi \cdot 10^2 = 100\pi$$

Искомая вероятность:

$$P = \frac{75\pi}{100\pi} = 0,75$$

## Замечание

В случае классического определения вероятность достоверного (невозможного) события равна единице (нулю); справедливы и обратные утверждения (например, если вероятность события равна нулю, то событие невозможно).

*В случае геометрического определения вероятности обратные утверждения не имеют места.*

# Задача о встрече


- Два человека договорились встретиться в течение часа, причем время ожидания первым относительно второго не превышает 15 минут. Найти вероятность их встречи.

## Решение.

Обозначим моменты прихода первого и второго соответственно через  $x$  и  $y$ . В силу условия задачи должны выполняться двойные неравенства:

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

Введем в рассмотрение  
прямоугольную систему  $xOy$ .






Таким образом,

$$P = \frac{S_g}{S_G} = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2}{1} = \frac{7}{16}$$

# Задачи

# Задача 1

В прямоугольник  $5 \times 4$  см<sup>2</sup> вписан круг радиуса 1,5 см. Какова вероятность того, что точка, случайным образом поставленная в прямоугольник, окажется внутри круга?




# Решение

- По определению геометрической вероятности искомая вероятность равна отношению площади круга (в который точка должна попасть) к площади прямоугольника, то есть

$$P(A) = \frac{\pi \cdot 1,5^2}{5 \cdot 4} = 0,353$$

## Задача 2

В квадрат со стороной 6 вписан круг.  
Наудачу в квадрат бросают точку.  
Найти вероятность, что точка попадет в  
круг.



# Решение

- По определению геометрической вероятности искомая вероятность равна отношению площади квадрата к площади круга
- Площадь квадрата со стороной 6 равна  $S=36$

- Заметим, что радиус вписанного в квадрат круга будет равен половине стороны квадрата,  $R=3$
- Площадь круга с радиусом  $R=3$  равна

$$S = \pi R^2 = \pi 3^2 = 9\pi$$

- Тогда вероятность

$$P(A) = \frac{9\pi}{36} = \frac{\pi}{4}$$

# Вопросы к лекции 3

- Напишите гипергеометрическую формулу
- Что называют относительной частотой?
- Что такое статистическая вероятность?
- Сумма событий
- Произведение событий
- Противоположные события. Пример
- Формула вычисления геометрической вероятности



**Конец лекции 2**