

Домашняя аптечка

занятие № 4



Аптечка — комплект лекарств, предназначенных для оказания первой медицинской помощи.

Виды аптечек



Туристическая

Виды аптечек



Офисная

Виды аптечек



Автомобильная

Виды аптечек



Для водного транспорта

Виды аптечек



Домашняя

В аптечке находятся средства для обработки ран (дезинфицирующие)

Применяют для обработки поверхности кожи, чтобы не было заражения, а также для промывания ран и остановки кровотечений.

Йод, раствор перекиси водорода, раствор бриллиантовой зелени, настойка календулы, марганцовка, пантенол.



Перевязочные материалы

Бинты, вата (в том числе и в стерильной упаковке), лейкопластырь разных видов, жгут, эластичные бинты.



Как нужно хранить домашнюю аптечку?

Домашнюю аптечку нужно хранить в тёмном, прохладном месте, недоступном для детей, но легкодоступном для взрослых.

Хранить лекарства желательно в просторной таре, например ящике или большой коробке, в которой можно разложить лекарства, чтобы легко можно было найти нужное.



Все препараты храните в упаковках, плотно закрывайте тюбики и пузырьки, в соответствии с требованиями к ним, и никогда не выбрасывайте инструкции.

Кроме лекарств в домашней аптечке должны быть номера экстренных телефонов.

Следите за сроком годности лекарств и читайте инструкции к ним.



Срок годности лекарств



Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

НО-ШПА®

(NO-SPA®)

Таблетки 40 мг

sanofi aventis

Регистрационный номер: П №011854/02

Торговое название: НО-ШПА®

Международное (непатентованное) название: Дроптаверин

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка содержит 40 мг дроптаверина гидрохлорида

Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки желтого с зеленоватым или оранжевым оттенком цвета, на одной стороне – маркировка "spa".

Фармакотерапевтическая группа:

Спазмолитическое средство. Код АТХ: А03А В02

Фармакологические свойства:

Дроптаверин представляет собой производное изохинолина, которое проявляет спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем подавления фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV).

Ингибирование фермента фосфодиэстеразы IV приводит к повышенной концентрации цАМФ, что инактивирует легкую цепочку киназы миозина (MLCK), что, в свою очередь, ведет к расслаблению гладкой мускулатуры.

Дроптаверин ингибирует фермент фосфодиэстеразу (ФДЭ) IV *in vitro* без ингибирования изоэнзимов ФДЭ III и ФДЭ V. Видимо, ФДЭ IV функционально очень

важна для снижения сократительной способности гладких мышц, что наводит на мысль о том, что селективные ингибиторы ФДЭ IV могут быть полезны при лечении гиперкинетических заболеваний и различных заболеваний, связанных со спастическими состояниями желудочно-кишечного тракта.

Фермент, гидролизующий цАМФ в клетках гладкой мускулатуры миокардия и сосудов, в основном является изоэнзимом ФДЭ III, это объясняет то, что дроптаверин является эффективным спазмолитическим агентом без серьезных сердечно-сосудистых побочных действий и сильной сердечно-сосудистой терапевтической активности.

Препарат эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервной, так и мышечной этиологии. Независимо от типа вегетативной иннервации, дроптаверин действует на гладкие мышцы, находящиеся в желудочно-кишечной, желчной, урогенитальной и сосудистой системах.

Показания к применению

- спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, пилорит,
- спазмы гладкой мускулатуры мочевого тракта: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря.

В качестве вспомогательной терапии:

- при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного происхождения: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, спазмы кардии и привратника, энтерит, колит, спастический колит с запором и метеористические формы спастического колита
- головные боли тензионного типа
- при гинекологических заболеваниях: дисменорея

Противопоказания

- повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата
- тяжелая печеночная или почечная недостаточность
- тяжелая сердечная недостаточность (синдром низкого сердечного выброса)
- форма таблеток не должна назначаться детям в возрасте до 1 года.

С осторожностью:

Применение препарата при гипотензии требует повышенной осторожности.



Будьте здоровы!

