

# Домашняя аптечка

## занятие № 4



*Аптечка* — комплект лекарств, предназначенных для оказания первой медицинской помощи.

# Виды аптечек



Туристическая

# Виды аптечек



Офисная

# Виды аптечек



**Автомобильная**

# Виды аптечек



Для водного транспорта

# Виды аптечек



Домашняя

# В аптечке находятся средства для обработки ран (дезинфицирующие)

Применяют для обработки поверхности кожи, чтобы не было заражения, а также для промывания ран и остановки кровотечений.

Йод, раствор перекиси водорода, раствор бриллиантовой зелени, настойка календулы, марганцовка, пантенол.



## Перевязочные материалы

Бинты, вата (в том числе и в стерильной упаковке), лейкопластырь разных видов, жгут, эластичные бинты.



# Как нужно хранить домашнюю аптечку?

Домашнюю аптечку нужно хранить в тёмном, прохладном месте, недоступном для детей, но легкодоступном для взрослых.

*Хранить лекарства желательно в просторной таре, например ящике или большой коробке, в которой можно разложить лекарства, чтобы легко можно было найти нужное.*



Все препараты храните в упаковках, плотно закрывайте тюбики и пузырьки, в соответствии с требованиями к ним, и никогда не выбрасывайте инструкции.

*Кроме лекарств в домашней аптечке должны быть номера экстренных телефонов.*

Следите за сроком годности лекарств и читайте инструкции к ним.





# Срок годности лекарств



# Инструкция

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

# НО-ШПА®

(NO-SPA®)

Таблетки 40 мг

sanofi aventis

Регистрационный номер: П №011854/02

Торговое название: НО-ШПА®

Международное (непатентованное) название: Дроптаверин

Лекарственная форма: таблетки

### Состав:

1 таблетка содержит 40 мг дроптаверина гидрохлорида

Вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

### Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки желтого с зеленоватым или оранжевым оттенком цвета, на одной стороне – маркировка "spa".

### Фармакотерапевтическая группа:

Спазмолитическое средство. Код АТХ: А03А В02

### Фармакологические свойства:

Дроптаверин представляет собой производное изохинолина, которое проявляет спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем подавления фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV).

Ингибирование фермента фосфодиэстеразы IV приводит к повышенной концентрации цАМФ, что инактивирует легкую цепочку киназы миозина (MLCK), что, в свою очередь, ведет к расслаблению гладкой мускулатуры.

Дроптаверин ингибирует фермент фосфодиэстеразу (ФДЭ) IV *in vitro* без ингибирования изоэнзимов ФДЭ III и ФДЭ V. Видимо, ФДЭ IV функционально очень

важна для снижения сократительной способности гладких мышц, что наводит на мысль о том, что селективные ингибиторы ФДЭ IV могут быть полезны при лечении гиперкинетических заболеваний и различных заболеваний, связанных со спастическими состояниями желудочно-кишечного тракта.

Фермент, гидролизующий цАМФ в клетках гладкой мускулатуры миокардия и сосудов, в основном является изоэнзимом ФДЭ III, это объясняет то, что дроптаверин является эффективным спазмолитическим агентом без серьезных сердечно-сосудистых побочных действий и сильной сердечно-сосудистой терапевтической активности.

Препарат эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервной, так и мышечной этиологии. Независимо от типа вегетативной иннервации, дроптаверин действует на гладкие мышцы, находящиеся в желудочно-кишечной, желчной, урогенитальной и сосудистой системах.

### Показания к применению

- спазмы гладкой мускулатуры, связанные с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, пилорит,
- спазмы гладкой мускулатуры мочевого тракта: нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит, тенезмы мочевого пузыря.

### В качестве вспомогательной терапии:

- при спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного происхождения: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, спазмы кардии и привратника, энтерит, колит, спастический колит с запором и метеористические формы спастического колита
- головные боли тензионного типа
- при гинекологических заболеваниях: дисменорея

### Противопоказания

- повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата
- тяжелая печеночная или почечная недостаточность
- тяжелая сердечная недостаточность (синдром низкого сердечного выброса)
- форма таблеток не должна назначаться детям в возрасте до 1 года.

### С осторожностью:

Применение препарата при гипотензии требует повышенной осторожности.



**Будьте здоровы!**

