

# Первичный туалет новорожденного



ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ 4  
КУРСА 172В ГРУППЫ  
КЛЕМЕНТЬЕВ ДЕНИС

- ▶ **Первичный туалет новорожденного** – комплекс санитарно-гигиенических манипуляций с новорожденным, проводимых в родзале сразу после его рождения.





- ▶ Перед родами подготавливается стерильный индивидуальный комплект для новорожденного: катетеры для отсасывания слизи из верхних дыхательных путей и носа, 3 стерильные пеленки, 2 зажима Кохера, палочки с ватой для обработки пуповины, ножницы, одеяло, скобка Роговина, пипетки и ватные шарики для профилактики гонобленнореи.

- ▶ **Этапы первичного туалета новорожденного:**
- ▶ отсасывание слизи из ротоглотки проводится резиновой грушей или катетером в момент рождения головы;
- ▶ Профилактика гонобленнореи
- ▶ новорожденного принимают в стерильную подогретую пеленку и укладывают на одном горизонтальном уровне с матерью (чтобы не допустить трансфузии крови к плаценте или к ребенку);
- ▶ повторно проводят отсасывание слизи из ротоглотки;
- ▶ обработка пуповины

# Отсасывание содержимого ротовой полости

1. В момент рождения головки ребенка акушерка с целью профилактики аспирации проводит отсасывание содержимое из ротовой полости и верхней части глотки (Но не из носовых ходов, ибо это может вызвать рефлексорный вдох и аспирацию содержимого ротовой полости!) при помощи электроотсоса или стерильной резиновой груши

# Отсасывание содержимого ротовой полости



## 2. Профилактика гонобленнореи (офтальмобленнореи)

- протереть веки от наружного угла к внутреннему

сухим ватным шариком (отдельным ватным шариком для каждого глаза),

- пальцами левой руки осторожно оттягивают нижнее веко вниз и, пользуясь стерильной пипеткой, наносят на слизистую оболочку (конъюнктиву) век по 1 капле 20% раствора сульфацила натрия (альбуцида),

- смыкание век и осторожное протираание от избытка раствора

- девочкам дополнительно в наружные половые органы по 1-2 капли стерильного свежеприготовленного 1-2% раствора нитрата серебра

- повторить профилактику офтальмобленнореи через 2 часа

# Профилактика гонобленнореи





# Следующей процедурой является перевязка пуповины и ее обработка первый этап:

3 Обработать пуповину 70% раствором этилового спирта в направлении от пупочного кольца к периферии, слегка отжимая оставшуюся кровь

Наложить один зажим Кохера на расстоянии 10-12см от пупочного кольца

Наложить второй зажим Кохера на 3-5-см дистальнее первого

Обработать расстояние между зажимами 70% раствором этилового спирта

Стерильными ножницами пересечь пуповину



## 4. Оценить состояние ребенка по шкале Апгар по 5 показателям (каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов):

1. Цвет кожных покровов
2. Пульс
3. Мышечный тонус
4. Частота дыхания
5. Рефлексы
6. В норме 8/10 баллов



# Шкала Апгар

	Оценка в баллах	Оценка в баллах	Оценка в баллах
<b>Клинический признак</b>	0 баллов	1 балл	2 балла
<b>Сердцебиение</b>	Отсутствует	Меньше 100 в 1 мин.	Больше 100 в 1 мин.
<b>Дыхание</b>	Отсутствует	Брадипное, нерегулярное	Нормальное, крик громкий
<b>Мышечный тонус</b>	Отсутствует	Легкое сгибание рук и ног	Активные движения
<b>Рефлекторная возбудимость</b>	Отсутствует	Гримаса	Чихание, кашель
<b>Цвет кожи</b>	Общая бледность или цианоз	Розовое туловище, цианоз рук и ног	Розовый

. Если позволяет состояние ребенка, то его выкладывают на живот матери



## Второй этап:

Обработать пуповину 70% раствором этилового спирта, включая кожу вокруг пупочного кольца.

Специальным инструментом на пуповину накладывают скобу Роговина на расстоянии 1,5-2 см от пупочного кольца

Стерильными ножницами пересечь пуповину на расстоянии 1-1,5 см от скобы Роговина

Обработать пуповину 5% раствором перманганата калия от центра к периферии, начиная со среза пуповины (не касаясь кожи вокруг пупочного кольца).

После описанной обработки на остаток пуповины накладывают стерильную 4-х-слойную треугольную марлевую повязку (повязка Чистяковой).

# Первичная обработка новорожденного

Первичную обработку кожи новорожденного проводят стерильным вазелиновым маслом которое готовят для однократного применения на одного ребенка во флаконах емкостью не более 30 мл. Стерильной салфеткой, смоченной в масле, снимают с кожи слизь, кровь. Удалять полностью обильную первородную смазку нецелесообразно, так как в ней содержатся некоторые ферменты, витамины, частично всасываемые кожей.



На 5-ой минуте жизни повторно  
оценить состояние ребенка по шкале  
Апгар



▶ **Спасибо за внимание!**

