

# *АКДС*

(адсорбированная коклюшно-  
дифтерийно-столбнячная  
вакцина)



# АКДС



- Комбинированная вакцина, состоящая из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных анатоксинов, столбнячного и дифтерийного, адсорбированных на гидроксиде алюминия.
- Консервант – мертиолят в концентрации 0,01%. Содержит в 1 мл препарата 20 млрд. коклюшных микробных клеток, 30 флокулирующих единиц (ЛФ) дифтерийного антитоксинсвязывающих единиц (ЕС) столбнячного анатоксина.

# Состав

- В одной первичной дозе (0,5 мл) содержится не менее 30 международных иммунизирующих единиц (МИЕ) дифтерийного анатоксина, не менее 60 МИЕ столбнячного анатоксина и не менее 4 международных защитных единиц коклюшной вакцины.
- Представляет собой суспензию белого или слегка желтоватого цвета, разделяющуюся при стоянии на прозрачную жидкость и рыхлый осадок, легко разбивающийся при встряхивании.

# Схема и путь введения

- В: 3 - 4,5 – 6 мес.
- РВ: 18 мес.
- в/м в наружный край 4-главой мышцы бедра
- Если ребенок до достижения 3 лет 11месяцев 29дней, не получил ревакцинацию АКДС-вакциной, то ее проводят АДС-анатоксином (для возрастов 4года – 5лет 11месяцев 29дней) или АДС – М-анатоксином (6 лет и старше)



# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- прогрессирующие заболевания нервной системы;
- афебрильные судороги в анамнезе;
- развитие на предшествующее введение АКДС-вакцины сильной общей реакции (повышение температуры в первые двое суток до 40,0 и выше) или осложнения.



# Местные осложнения (24 – 48 ч)

- значительное увеличение и уплотнение в месте инъекции;
- отек места инъекции больше 8 см в диаметре;
- аллергия;
- покраснение кожи.



# Системные осложнения

- Повышение  $t$  выше 39 С
- Судороги фебрильные (при  $t$  38 С и выше), афебрильные (при  $N t$ )
- Анафилактический шок
- Лимфаденопатия
- Головные боли, раздражительность
- Расстройство пищеварения



- Тяжелые аллергические реакции (отек Квинке, крапивница и т.д.)
- Снижение давления, мышечного тонуса
- Потеря сознания
- Менингит или энцефалит
- Нарушение чувствительности
- Полирадикулоневрит
- Уменьшение количества тромбоцитов



# Форма выпуска

- ампулы по 1,0 мл (2 прививочные дозы).
- в упаковке содержится 10 ампул.



# Хранение

- в сухом темном месте при  $t (6 \pm 2)^\circ\text{C}$
- беречь от замораживания!
- срок годности: 1 год  
6 месяцев.



A baby with light brown hair, wearing a light blue long-sleeved shirt and pants, is sitting on a patch of green grass. The baby is smiling and looking towards the camera. Several bright green apples are scattered on the grass around the baby. The background is a solid, light green color.

***Будьте здоровы!***