

**ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ВВОДНЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ**

**ТЕМА: САЛЬМОНЕЛЛЁЗЫ**

**ПРОФЕССОР**

**ДОКТОР  
МЕДИЦИНСКИХ  
НАУК**

**ВАСЮНИН  
АЛЕКСАНДР  
ВАСИЛЬЕВИЧ**



# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

## **1. Сальмонеллы во внешней среде**

**1 мало устойчивы**

**2 неустойчивы**

**3 устойчивы**

**4 высоко устойчивы**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**2. В эпидемиологическом отношении  
наиболее опасны**

**1 носители**

**2 больные сальмонеллёзом  
в разгар болезни**

**3 больные сальмонеллёзом  
в период реконвалесценции**

**4 больные сальмонеллёзом  
животные**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**3. Брюшной тиф вызывает сальмонелла**

**1 thyphumurium**

**2 enteritidis**

**3 cholera suis**

**4 thyphi abdominis**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**4. Ведущий механизм диареи при  
сальмонеллёзе**

**1 цитотоксический**

**2 осмотический**

**3 секреторный**

**4 моторно – эвакуаторный**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**5.Основной механизм передачи  
сальмонеллёза, вызванного  
сальмонеллой тифа, паратифа**

**1 аэрогенный**

**2 фекально-оральный**

**3 парентеральный**

**4 контактный**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**6. Сальмонеллы могут быть обнаружены**

**1 только в копрокультуре**

**2 только в уринокультуре**

**3 только в гемокультуре**

**4 в копрокультуре,  
уринокультуре,  
гемокультуре**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

## **7. Характер стула при сальмонеллёзе**

**1 обильный, водянистый,  
жёлтого цвета**

**2 тёмно зелёный, зловонный,  
по типу «болотной тины»**

**3 скудный, по типу «ректального  
плевка»**

**4 обильный, водянистый,  
по типу «рисового отвара»**



# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**8. Типичный уровень поражения ЖКТ  
при сальмонеллёзе**

**1 пищевод**

**2 желудок**

**3 тонкий кишечник**

**4 толстый кишечник**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**9. При оценке степени тяжести  
сальмонеллёза можно пренебречь**

**1 повышением температуры**

**2 обилием стула**

**3 длительностью**

**бактериовыделения**

**4 выраженностью**

**нейтрофилеза**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**10. Стул калового характера, жидкий, обильный, коричнево-зеленого цвета, с примесью слизи, перемешанной с каловыми массами. Характер стула типичен**

**1 для гастрита**

**2 энтерита**

**3 колита**

**4 энтероколита**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**11. Копрограмма: микроскопия- слизь++++, лейкоциты сплошь, эритроциты+, эпителий+.**

**Верное заключение:**

**1 гастрит**

**2 энтерит**

**3 колит**

**4 энтероколит**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**12. При секреторном механизме  
диареи более целесообразно  
использовать**

**1 раствор глюкозы**

**2 солевой раствор**

**3 глюкозо-солевой раствор**

**4 воду**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**13. Сорбенты целесообразно применять**

**1 одновременно с другими  
препаратами**

**2 за 30 минут до приема других  
препаратов**

**3 через 30 минут после приема  
других препаратов**

**4 между приемом других препаратов**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**14. Диспансерное наблюдение при  
остром сальмонеллёзе  
осуществляется**

- 1 1 месяц**
- 2 3 месяца**
- 3 6 месяцев**
- 4 12 месяцев**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**15. В очаге сальмонеллёзной  
инфекции контактным  
целесообразно применить**

**1 антибиотик**

**2 вакцину**

**3 иммуноглобулин**

**4 бактериофаг**



# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**16. Из сорбентов в настоящее время для  
лечения не используется**

**1 белая глина**

**2 смекта**

**3 активированный уголь**

**4 фильтрум-сти**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**17. Препарат предпочтительного выбора  
для лечения сальмонеллёза лёгкой  
степени тяжести**

**1 гентамицин**

**2 амоксиклав**

**3 эритромицин**

**4 ципрофлоксацин**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**18. Наиболее достоверный диагностический признак**

**1 контакт с больным  
сальмонеллёзом**

**2 обнаружение сальмонелл  
в копрокультуре**

**3 общий анализ крови**

**4 копрограмма**

# **ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**19. Вакцинацию по плану  
необходимо проводить после  
выздоровления**

**1 через 2-4 недели**

**2 1-2 месяца**

**3 1-2 недели**

**4 2-4 месяца**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН  
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**20. Препарат специфической  
профилактики сальмонеллёза, кроме**

**1 вакцины**

**2 бактериофага**

**3 иммуноглобулина**

**4 бактрима**

# ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

<b>1-3</b>	<b>6-4</b>	<b>11-3</b>	<b>16-3</b>
<b>2-1</b>	<b>7-2</b>	<b>12-3</b>	<b>17-4</b>
<b>3-4</b>	<b>8-3</b>	<b>13-4</b>	<b>18-2</b>
<b>4-3</b>	<b>9-3</b>	<b>14-1</b>	<b>19-1</b>
<b>5-2</b>	<b>10-2</b>	<b>15-4</b>	<b>20-4</b>