

**ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ВВОДНЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ**

ТЕМА: САЛЬМОНЕЛЛЁЗЫ

ПРОФЕССОР

**ДОКТОР
МЕДИЦИНСКИХ
НАУК**

**ВАСЮНИН
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ**



ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

1. Сальмонеллы во внешней среде

1 мало устойчивы

2 неустойчивы

3 устойчивы

4 высоко устойчивы

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**2. В эпидемиологическом отношении
наиболее опасны**

1 носители

**2 больные сальмонеллёзом
в разгар болезни**

**3 больные сальмонеллёзом
в период реконвалесценции**

**4 больные сальмонеллёзом
животные**

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

3. Брюшной тиф вызывает сальмонелла

1 thyphumrium

2 enteritidis

3 cholera suis

4 thyphi abdominis

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**4. Ведущий механизм диареи при
сальмонеллёзе**

1 цитотоксический

2 осмотический

3 секреторный

4 моторно – эвакуаторный

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**5.Основной механизм передачи
сальмонеллёза, вызванного
сальмонеллой тифа, паратифа**

1 аэрогенный

2 фекально-оральный

3 парентеральный

4 контактный

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

6. Сальмонеллы могут быть обнаружены

1 только в копрокультуре

2 только в уринокультуре

3 только в гемокультуре

**4 в копрокультуре,
уринокультуре,
гемокультуре**

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

7. Характер стула при сальмонеллёзе

**1 обильный, водянистый,
жёлтого цвета**

**2 тёмно зелёный, зловонный,
по типу «болотной тины»**

**3 скудный, по типу «ректального
плевка»**

**4 обильный, водянистый,
по типу «рисового отвара»**

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**8. Типичный уровень поражения ЖКТ
при сальмонеллёзе**

1 пищевод

2 желудок

3 тонкий кишечник

4 толстый кишечник

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**9. При оценке степени тяжести
сальмонеллёза можно пренебречь**

1 повышением температуры

2 обилием стула

3 длительностью

бактериовыделения

4 выраженностью

нейтрофилеза

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

10. Стул калового характера, жидкий, обильный, коричнево-зеленого цвета, с примесью слизи, перемешанной с каловыми массами. Характер стула типичен

1 для гастрита

2 энтерита

3 колита

4 энтероколита

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

11. Копрограмма: микроскопия- слизь++++, лейкоциты сплошь, эритроциты+, эпителий+.

Верное заключение:

1 гастрит

2 энтерит

3 колит

4 энтероколит

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**12. При секреторном механизме
диареи более целесообразно
использовать**

1 раствор глюкозы

2 солевой раствор

3 глюкозо-солевой раствор

4 воду

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

13. Сорбенты целесообразно применять

**1 одновременно с другими
препаратами**

**2 за 30 минут до приема других
препаратов**

**3 через 30 минут после приема
других препаратов**

4 между приемом других препаратов

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**14. Диспансерное наблюдение при
остром сальмонеллёзе
осуществляется**

- 1 1 месяц**
- 2 3 месяца**
- 3 6 месяцев**
- 4 12 месяцев**

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

**15. В очаге сальмонеллёзной
инфекции контактным
целесообразно применить**

1 антибиотик

2 вакцину

3 иммуноглобулин

4 бактериофаг

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**16. Из сорбентов в настоящее время для
лечения не используется**

1 белая глина

2 смекта

3 активированный уголь

4 фильтрум-сти

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

17. Препарат предпочтительного выбора для лечения сальмонеллёза лёгкой степени тяжести

1 гентамицин

2 амоксиклав

3 эритромицин

4 ципрофлоксацин

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

18. Наиболее достоверный диагностический признак

1 контакт с больным

сальмонеллёзом

2 обнаружение сальмонелл

в копрокультуре

3 общий анализ крови

4 копрограмма

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

**19. Вакцинацию по плану
необходимо проводить после
выздоровления**

1 через 2-4 недели

2 1-2 месяца

3 1-2 недели

4 2-4 месяца

**ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!**

20. Препарат специфической профилактики сальмонеллёза, кроме

1 вакцины

2 бактериофага

3 иммуноглобулина

4 бактрима

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1-3

6-4

11-3

16-3

2-1

7-2

12-3

17-4

3-4

8-3

13-4

18-2

4-3

9-3

14-1

19-1

5-2

10-2

15-4

20-4