



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМАХ



ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ



РАСТЯЖЕНИЯ


ВЫВИХИ

ПЕРЕЛОМЫ




РАСТЯЖЕНИЕ


чрезмерное пере
мышечных



Голен
су




СИМПТОМЫ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ



- Боль
- Припухлость
- Синюшность
- Движение
ограничено и
болезненно

ПМП при растяжении



*Если ты болен, лежи в постели
столько, сколько велел врач.*

ВЫВИХ

смещение суставных
относительно


стей




Плечевой
сустав



Локтевой
сустав




СИМПТОМЫ ПРИ ВЫВИХАХ



- Боль
- Деформация
- Укорочение конечности

ПМП при вывихах

Главное – быстро, не причиняя боли доставить в больницу!




ИХИ –
едура!

ПЕРЕЛОМ

полное или частичное нарушение
целостности

кости



Рука


Открытый

(кожа повреждена)




Закрытый

(кожа не повреждена)



Н

СИМПТОМЫ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ




- Сильная боль
- Деформация
- Кровоизлияние
- Нет опоры

ПМП при переломах



П
□ о
□ о

ние



Над

ие!