ФОЗИНАП

Баланс эффективности и безопасности в терапии пожилых пациентов с артериальной гипертонией

ФОЗИНАП • ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ОРГАНОПРОТЕКЦИЮ

Индекс липофильности активных форм ингибиторов АПФ

Фозинап

- Трандолаприлат
- Квинаприлат
- Рамиприлат
- Периндоприлат
- Эналаприлат
- Каптоприл
- Лизиноприл

>2,00

1,46

1,42

0,92

0,87

0,11

0,08

-2,44

макс. липофильность – высокая органопротекция

макс. гидрофильность – низкая органопротекция

Повышение гидрофильности **Повышение липофильности**

ФОЗИНАП • ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГРЕССИЮ ГМЛЖ

ФОЗИНАП НЕ ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, НО И СПОСОБСТВУЕТ ЕЕ РЕГРЕСИИ*



* Cheung B.M., Lau C.P. Fosinopril reduces left ventricular mass in untreated hypertensive patients: a controlled trial // Br J Clin Pharmacol. 1999 Feb. Vol. 47 (2). P. 179–187

ФОЗИНАП • ВЫСОКИЙ НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Изменение уровня креатинина , протеинурии и потребности в гемодиализе



*Marin R, Ruilope LM, Aljama P, Armanda P, Segura J, Diez J; Investigators of the **ESPIRAL** Study. Efecto del tratamiento antihipertensivo Sobre la Progresion de la Insuficiencia RenAL en pacientes no diabeticos. A random comparison of fosinopril and nifedipine GITS in patients with primary renal disease.// J Hypertens. 2001 Oct;19(10):1871-6.*

ФОЗИНАП® • СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ ПУТЬ ВЫВЕДЕНИЯ*

Фармакодинамика выведения и-АПФ

Двойной путь выведения препарата Фозинап обеспечивает возможность назначить препарат у пациентов, как с почечной недостаточностью, так и с высокой лекарственной нагрузкой на печень*

* Инструкции по применению препарата

ФОЗИНАП • НИЗКИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАШЛЯ*

ФОЗИНАП® РЕЖЕ ДРУГИХ И-АПФ ВЫЗЫВАЕТ КАШЕЛЬ И ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ*

Причины отмены и-АПФ у больных ХСН



в среднем И-АПФ

ФОЗИНАП

* Bart B. A. et al. Eur. Heart J. 1999 Vol. 20 P. 1182 - 1190