

Анальгетикалық белсенділігі бар опиоидты емес орталық әсерлі препараттар

Қабылдаған: Мұхабетов Н.М
Орындаған: Ешенкулова Д.А

Бейнаркотикалық анальгетиктер 3 өте маңызды фармакологиялық әсер көрсетеді.

1.Қабынуға қарсы әсері.

Простагландин концентрациясын төмендеу гистамин, брадикинин, серотониннің сезімтал рецепторларға әсерін төмендетеді

2.Анальгезиялаушы әсері.

Простагландиндердің гиперальгезиясын шақырады. Ауырсыну рецепторларының сезімталдығын жоғарылатады.

3. Қызбаны түсіруші әсері.

Ми сұйықтығында простагландин E_2 концентрациясының жоғарылауына және жылу берудің төмендеуіне алып келеді.

Бейнаркотикалық анальгетиктер келесі топқа жіктеледі:

1. Салицил қышқылының туындылары:
Ацетилсалицил қышқылы (аспирин)
Нитилсалицилат


2. Пиразолон туындылары:
амидопирин, анальгин, баралгин,
темпалгин, бутадион

3. Анилин туындылары:
Парацетамол, антигриппин,
панадол, фенацитин, колдрекс

4. Әр түрлі химиялық туындылар:
Кетанав, долгит крем, желчь,
диклофенак, ортофен

Салицил қышқылының туындылары





Анилин туынддылары










Пиразалон туындылары











Әр түрлі химиялық туындылар





