


Рис. 28. Схема развития мужского гаметофита (A) и женского гаметофита (зародышевого мешка) *Polygonum*-типа (B):


1 — микроспора, или материнская клетка, пыльцевого зерна; 2 — двухклеточное пыльцевое зерно, клетка-трубка и генеративная клетка; 3 — деление генеративной клетки; 4 — трехклеточное пыльцевое зерно (спермии-клетки свободно лежат в цитоплазме клетки-трубки); 5 — прорастание пыльцевого зерна; 6 — мегаспора; 7—8 — первое деление ядра мегаспоры; 9 — второе деление, четырехъядерная стадия развития женского гаметофита; 10 — третье деление, восьмиядерная стадия; 11 — зрелый семиклеточный женский гаметофит (в нем различаются яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид, центральная клетка с двумя полярными ядрами и три антиподы); 12 — двойное оплодотворение (слияние спермииев с ядром яйцеклетки и с объединившимися ядрами центральной клетки). Одна из синергид дегенерирует (заштрихована), в ней видны остатки содержимого пыльцевой трубки.

Пыльцевое зерно


- Двухклеточное пыльцевое зерно цветковых растений – это уникальная конструкция, построенная по типу «клетка-в-клетке».
- Почти вся цитоплазма достается большой вегетативной клетке с крупным диффузным ядром. Она формирует пыльцевую трубку и доставляет спермии к яйцеклетке.
- Внутри этой клетки располагается генеративная (гаметогенная) клетка с конденсированным хроматином, малым числом органелл и запасных веществ. Она делится с образованием двух спермиеев.



Строение пыльцы (пыльцевого зерна)








1

2

3

4


5





6

7

8






Ovule

Megaspore
Mother Cell



Integuments


Megasporangium (nucellus)



Строение семязачатка (семяпочки) и зародышевого мешка (женского гаметофита) покрытосеменных растений


1 - покровы семязачатка, или интегументы (а - наружный, б - внутренний), 2 - микропиле , 3 - халаза , 4 - фуникулус , 5 - нуцеллус , 6 - зародышевый мешок , 7 - яйцеклетка , 8 - синергиды , 9 - антиподы ,
10 - вторичное ядро, 11 - плацента , 12 -проводящий пучок.





Типы женского гаметофита	Мегаспорогенез			Развитие женского гаметофита			
	1	2	3	4	5	6	7
Моноспорический (<i>Polygonum</i> -типа)							
Биспорический (<i>Allium</i> -типа)				X			
Тетраспорический (<i>Adoxa</i> -типа)				X	X		

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ



Двойное оплодотворение

Из интегументов
образуется
семенная кожура.

Из всего семязачатка
– семя.

Из стенок завязи –
околоплодник.

В целом из завязи
пестика –
плод с семенами.

Открыто двойное
оплодотворение
в 1898 году русским
ботаником
С.Г.Навашиным.

